



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...**

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

**vol. 1:** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 112, Page 113, Page 114, Page 115, Page 116

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 16 January 2025 7:12 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1766903i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.



CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:ITIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.  
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;  
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.  
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,  
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,  
SYNONYMIS SELECTIS,  
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

---

*Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.



*Erica africana*, unedonis flore amplo, foliis cordiformibus in acumen desinentibus. *Raj. dendr.* 97.

*Tithymali myrsinitis* specie arbuscula æthiopica, flore parvo e lata basi in acutissimum mucronem subito desinente, capitulis origani. *Pluk. mant.* 183.

*Habitat in Æthiopia.* ♪

*squamosa.*

3. *PENÆA* foliis rhombæo-cuneiformibus carnosis.

*Habitat in Æthiopia*

*Hæc reliquis minor; Corolla (ut in præcedente) acuta.*

*Folia parte dimidia superiore patula.*

### BLÆRIA.

*ericoides.*

1. *BLÆRIA Hort. cliff.* 49.

*Erica carnea*, promontorii bonæ spei, foliis & floribus villosis. *Pet. gaz. t. 2. f. 10.*

*Habitat ad Cap. b. Spei.* ♪

### BUDDLEJA.

*americana.*

1. *BUDDLEJA. Amm. herb.* 577. *Hort. cliff.* 35.

*Ophioxylon americanum*, foliis oblongis mucronatis leviter ferratis bardanæ iustar subtus lanuginosis. *Pluk. alm.* 270. *t. 210. f. 1.*

*Verbasci folio minore arbor*, floribus spicatis luteis, feminibus singulis oblongis in singulis vasculis ficcis.

*Sloan. jam.* 139. *hist.* 2. *p. 29. f. 1. Raj. dendr.* 97.

*Habitat in Caribæis ad ripas & torrentes.*

### EXACUM.

*sessile.*

1. *EXACUM* floribus sessilibus. *Fl. zeyl.* 25. \*

*Exacum. Amœn. acad.* 1. *p. 391. \**

Planta annua, facie centaurii æthiopici. *Pluk. pbyt.* 275. *f. 3.*

*Habitat in Asia & Africa.*

*pedunculat.*

2. *EXACUM* floribus pedunculatis.

*Centaurium minus hypericoides*, flore luteo, lini capitulis. *Pluk. mant.* 43. *t. 343. f. 3*

*Habitat in India.* ☉

### PLANTAGO.

\* *Scapo nudo.*

*major.*

1. *PLANTAGO* foliis ovatis glabris, nudo scapo tereti, spica flosculis imbricatis.

*Plantago foliis ovatis glabris. Hort. cliff.* 43. *Fl. suec.*



122. *Mat. med.* 49. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 470.  
*Dalib. paris.* 50.
- Plantago scapo spicato, foliis ovatis. *Fl. lapp.* 62.
- Plantago latifolia sinuata. *Bauh. pin.* 189.
- Plantago major. *Cam. epit.* 261.
- β. Plantago latifolia glabra minor. *Bauh. pin.* 189.
- γ. Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis. *Bauh. pin.* 189. *Hort. ups.* 29.
- δ. Plantago latifolia rosea, flore expanso. *Bauh. pin.* 189.
- ε. Plantago latifolia, spica multiplici sparfa. *Bauh. pin.* 189.  
*Habitat in Europa ad vias.* 2
2. PLANTAGO foliis ovatis glabris, scapo angulato; *asiatica:*  
 spica flosculis distinctis.  
*Habitat in China, Sibiria.*  
*Planta ita refert P. majorem, ut quivis facile eandem diceret. At differt Spica longiore, floribus remotis & distantibus, Foliis sæpius basi subdentatis, Scapo angulato.*
3. PLANTAGO foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, *media:*  
 spica cylindrica, scapo tereti. *Hort. cliff.* 36. *Fl. suec.* 123, *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 472. *Dalib. paris.* 50.  
 Plantago latifolia incana. *Bauh. pin.* 189.  
 Plantago major incana. *Clus. hist.* 2. p. 109.  
 β. Plantago latifolia hirsuta minor. *Bauh. pin.* 189.  
 Plantago latifolia incana, spicis variis. *Bauh. pin.* 189.  
*Moris. hist.* 3. f. 8. t. 15. f. 9.  
*Habitat in Europæ pascuis sterilibus apricis argillosis.* 2
4. PLANTAGO foliis lanceolato-ovatis pubescentibus *virginica:*  
 subdenticulatis, spicis laxis pubescentibus, scapo angulato. *Gron. virg.* 16.  
 Plantago media incana virginiana, ferratis foliis, annua.  
*Moris. hist.* 3. p. 259. f. 8. t. 15. f. 8.  
 Plantago virginiana, pilosellæ foliis angustis, radice turbinata. *Pluk. alm.* 298.  
 Plantago myosotis f. trinervia hirsuta carolina. *Raj. hist.* 2. p. 1889.  
*Habitat in Virginia.*
5. PLANTAGO foliis lanceolatis, spica subovata nuda, *lanceolata:*  
 scapo angulato, *Vir. cliff.* 9. *Hort. cliff.* 36. *Roy. lugdb.* 401. *Hall. helv.* 471. *Dalib. paris.* 50.  
 Plantago angustifolia major. *Bauh. pin.* 189.  
 Plantago minor. *Dod. pempt.* 102



β. *Plantago trinervia*, folio angustissimo. *Bauh. pin.* 189. *prodr.* 98.

δ. *Plantago angustifolia major*, caulium summitate foliosa. *Bauh. pin.* 189.

*Habitat in Europæ campis sterilibus.* ♀

*lagopus.*

6. **PLANTAGO** foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta, scapo angulato.

*Plantago angustifolia*, paniculis lagopi. *Bauh. pin.* 189. *prodr.* 98. *Moris. hist.* 3. f. 8. t. 16. f. 13.

*Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania.*

*Bractea s. squama in spica surt densissimo tomentoso-hirsuta; Basis foliorum pilosa.*

*albicans.*

7. **PLANTAGO** foliis lineari-lanceolatis hirsutis, spica cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus*, scapo longitudine foliorum, spica oblonga. *Hort. cliff.* 37. *Roy. lugdb.* 401.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus*, scapo foliis duplo longiore, spica oblonga. *Sauv. monsp.* 26.

*Holosteum hirsutum albicans majus.* *Bauh. pin.* 190.

*Holosteum salmanticense majus.* *Clus. hist.* 2. p. 110.

β. *Holosteum hirsutum albicans minus.* *Bauh. pin.* 190.

*Habitat in Hispaniæ & Narbonæ aridis.*

*alpina.*

8. **PLANTAGO** foliis linearibus planis hirsutis, spica oblonga erecta.

*Plantago foliis linearibus*, spica oblonga. *Hall. helv.* 471.

*Holosteum hirsutum nigricans.* *Bauh. pin.* 190.

*Habitat in Helvetiæ alpibus.*

*cretica.*

9. **PLANTAGO** foliis linearibus, scapo brevissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti. *Hort. cliff.* 36. *Roy, lugdb.* 401.

*Holosteum s. Leontopodium creticum.* *Bauh. pin.* 190.

*Leontopodium creticum.* *Clus. hist.* 2. p. 11.

*Habitat in Creta.*

*maritima.*

10. **PLANTAGO** foliis semicylindraccis integerrimis: basi lanatis, scapo tereti. *Fl. suec.* 127.

*Plantago scapo spicato*, foliis linearibus subtus convexis. *Fl. lapp.* 63. *Lob. obs.* 163.

*Coronopus maritimus major.* *Bauh. pin.* 190.

*Habitat in littoribus marimis Europæ borealis.*

*Basis foliorum pilosa est, unde affinitas summa specierum*



6. 7. 8. 9. 11. *sed quæ vis naturæ efficeret tam varia?  
an locus; an copula.*

11. PLANTAGO foliis subulatis triquetris rigidis, scapo *subulato*, tereti. *Roy. lugdb. 402*  
 Plantago foliis triangulari-prismaticis. *Guett. stamp. 2. p. 428.*  
 Holoosteum, strictissimo folio, minus. *Bauh. pin. 191.*  
 Serpentina omnium minima. *Lob. ic. 439.*  
 β. Holoosteum maffiliense. *Bauh. pin. 190.*  
*Habitat in maritimis Mediterranei arenosis.*
12. PLANTAGO foliis linearibus dentatis, scapo tereti. *Coronopus.*  
 Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. *Hort. cliff. 37. Fl. suec. 126. Roy. lugdb. 401. Dalib. paris. 50.*  
 Coronopus sylvestris hirsutior. *Bauh. pin. 190.*  
 Herba itella. s. Cornu Cervinum. *Dod. pempt. 109.*  
 β. Coronopus hortensis. *Bauh. pin. 190.*  
*Habitat in Europæ glareosis.*
13. PLANTAGO foliis linearibus subdentatis, scapo tereti, spica ovata: bracteis carinatis membranaceis. *Læfl. löflingit.*  
*Habitat in Hispaniæ collibus agrorumque marginibus. ☉*  
*Differt a P. Coronopo quod sit minor & præcocior; spica ovata, ejus vero longa. Floribus rarius imbricatis: bracteis glabris navicularibus; ejus vero subulatis angustissimis pubescentibus. Stamina brevioribus. Calycis foliolis acutioribus; colore corollæ magis fusco. Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis. Scapus pilosus est. Læfl.*
14. PLANTAGO scapo unifloro. *Fl. lapp. 64. Fl. suec. uniflora 128. Dalib. paris. 50.*  
 Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. *Juss. act. 1742. p. 131. t. 7. Guett. stamp. 2. p. 26.*  
 Gramen junceum, capitulis quatuor longissimis filamentis donatis. *Pluk. alm. 180. t. 35. f. 2. Moris. hist. 3. f. 8. t. 9. f. 30.*  
*Habitat ad Europæ littora lacuum.*
- β *Caule ramoso.*
15. PLANTAGO caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis. *Hort. ups. 29. \** *Psyllium.*  
 Plantago caule ramoso. *Vir. cliff. 9. Roy. lugdb. 401.*  
 Plantago annua, foliis integerrimis, caule ramoso erecto. *Hort. cliff. 37. Dalib. paris. 51.*



*Psyllium majus erectum. Bauh. pin. 191.*  
*Habitat in Europæ australis sepibus. ☉*

*Cynops.*

16. PLANTAGO caule ramofo, foliis dentatis, spicis aphyllis. *Hort. ups. 28. Mat. med. 50.*

*Psyllium dioscoridis vel indicum, foliis crenatis. Bauh. pin. 191.*

*Habitat in India. ☉*

### SCOPARIA.

*dulcis.*

1. SCOPARIA. *Gen. nov. 1098.*

*Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. cliff. 320. Roy. lugdb. 301.*

*Samoloides. Boerb. lugdb. 2. p. 265. \**

*Veronica americana erecta frutescens & ramofo. Herm. parad. 241. t. 241.*

*Veronica fruticofa erecta dulcis, hexangulari caule. Sloan. hift. 1. p. 195. t. 108. f. 2.*

*Phyteuoides americanum, flore albo tetrapetalo. Pluk. alm. 296. t. 215. f. 1.*

*Habitat in Jamaica, Curaffao. ☉*

### CENTUNCULUS.

*minimus.*

1. CENTUNCULUS. *Dill. giff. 161. gen. III. E.N. C. 5. app. 92. t. 10. f. 31.*

*Centunculus foliis alternis ovatis. Fl. suec. 129. Dalib. paris. 52.*

*Anagallidiastrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. Mitch. gen. 14. t. 18.*

*Anagallis paludofa minima. Vaill. paris. 12. t. 4. f. 2.*

*Alfine palustris minima, flosculis albis. Mentz. pug. t. 4. f. 5.*

*Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Scaniæ arenofis. ☉*

### SANGUISORBA.

*officinalis.*

1. SANGUISORBA spicis ovatis. *Hort. cliff. 39. Fl. suec. 130. Mat. med. 51. Roy. lugdb. 240. Dalib. paris. 51.*

*Pimpinella fangviforba major. Bauh. pin. 160.*

*Pimpinella fylveftris f. fangviforba major. Dod. pempt. 105.*

β. PIMPINELLA major rigida præalta auriculata subnuda. *Bocc. mus. 2. p. 19. t. 7.*

*Habitat in Europæ pratis ficcioribus. ♀*



The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R: crg. M: ris Sveciæ Ancuia TRI; Mzopic.: & BorAx,  
Paorrss. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;  
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.  
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES  
PLANTARUM,

EXHIBENTES  
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD  
GENERA RELATAS,  
CUM  
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,  
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,  
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.  
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,  
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,  
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 112]

11L TETRANDRIA MONOGYNIA.

Erica africana, unedonis flore amplo, foliis cordiformibus in acumen definentibus. Raj. dendr. 97. |  
Tithymali myrfinitis fpecie arbufcula xthiopica, flore ` parvo e lata bafi in acutiffimum mucronem fubito definente, capitulis origani. Plak. mant. 183.  
Habitat im [Ethiopia. b



SJanamofa. 3. PENZEA foliis rhombzo-cuneiformibus carnofis.  
Habitat in JEthiopia  
Hec reliquis minor; Corolla (ut im precedente) acuta.  
Folia parte dimidia fuperiore patula.

#### BLAERIA.

ericoides. — 1. BLZERIA Hort. cliff. 49. |  
Erica carnea, promontorii bone fpei, foliis & floribus vil-  
lofis. Pez. gaz. t. 2. f. 10.  
Habitat ad Cap. b. Spei. b

#### BUDDLEJA.

americana. 1. BUDDLEJA. Amm. herb. \$77. Hort. chiff: 55.  
. Ophioxylon americanum, foliis oblongis mÿcronatisle- |  
viter ferratis bardana iuftar fubtus lanuginofis. Plak.  
alm. 270. t. 210. f. 1. : !  
Verbaifci folio minore arbor, floribus fpicatis luteis , fe- )  
minibus fingulis oblongis in fingulis vafculis. ficcis. -  
Sloan. jam. 139. hift. 2. p. 29. f. 1. Raj. dendr.97. |  
Habitat in Caribxis ad ripas CF torrentes. ink

#### EXACUM.

Jifiile, 1. EXACUM floribus feffilibus. F7. zeyl. 25. \*

\*

Exacum. 7mm. acad. 1. p. 391. ! ]  
Planta annua, facie centaurii zthiopici. Pluk. phys. 295. |

f. 3.

Habitat ian Afia & Africa. |  
pélyng, 2. EXACUM floribus pedunculatis, i |  
' Centaurium minus hypcricoides, flore luteo, lini ca -

pitulis. Pluk. mant. 43. t. 343. f.  
Habitat in India. © \$539 P3

#### PLANTAGO.

\* Scapo nudo.  
mde, ^ 1. PLANT AGO foliis ovatis glabris, nudo fcapo tereti,  
fpica flofculis imbricatis.  
Plantago foliis ovatis glabris. Herz. cliff. 43. Fl. Juec.  
| 121.

SNE



TETRANDRIA MONOGYNIA.

! 122. Mat. med. 49. Roy. lugdb. 40x. Hall; bel. 476.

Dalib. parif. \$0. -

Plantago fcapo fpicato, foliis ovatis. £7. lapp: 62; €?

Plintago latifolia finuata. Bauh. pia. 189.

Plantago major. Gam. epit. 261. — MAIS

B. Plantago latifolia glabra minor. Bash. pia 189;

. V. Plantago latifolia rofea, foribus quafi in fpica dif-pofis =~

tis. Bauh. pin. Y89. Hort. upf. 29. M i

d. Plaritago latifolia rofea, fiore expanfo. Bauh. pin. 189.

€ Plántago latifolia, fpica multiplici fpatfa: Bauh. pin.189.

Habitat in Europa ad vias y `

2. PLANTAGO foliis ovatis glabris ; {capo angulato ; ofaticá;  
fpica flofculis didinétis.'

Habitat ip China, Sibiria;

anta ita refert P. majorem, ut quivis facile eandem

^ dicéret. At differt Spica lozgiore , floribus remotis £9

diflantibns, Foliis fepins bafi Jubdentatis; Scapo angu-

ato,

|. 33 PLANTAGO foliis ovato-lánceolatis "pubefcentibus, media:

=- fpica cylindrica, fcapo %reti, Hort: vliff. 36. FI: fuec.

| 123, Roy: lugdó. 401. Hall, belv.. 472. Dalit: párif:

jo. ; Lone ule TECUM uir

Plantago latifolia incana. Báub.pim.189. >

"Plantago major incana. Claf: hift: 2i p: 109s ...

. lantago latifolia hifuta minor, Baup: bin. 189: E

lantago latifolia incana, fpicis variis. Bab. pin: 189.

Morif. Pil. 3. f. 8. t I\$, f: 9. i

Habitat in Europz pafcuís flerilibus apricis argillofs.t

. \* PLANTAGO foliis lanceolato-ovatis pubefcentibus vírginicá;

fúbdenticulatis , {picis laxis pubefcentibus, fcapo an-

gulato.. Gro, virg; 16.

lantago media incana virginiana, ferratis foliis „annua.

Morif. bil. 3. p. 259. f. 8. t: 15. f. S. |

latifago virginiana, pilofellz foliis anguítis, radice tur-

binatá. P/z4. Mg. 298. d .

lantago myofotis f. trinervia hifutá carolina. Raj: hift:

2. p; 188 E

Habitat m Virgini.

S- PLANTAGO foliis lanceolatis, fpicá fubóvatd iláda, janceolaté:

- .. feapo angulato, Vir. elif, 9. Hort. cliff; 36: Roy.

P l»gdb. 40i. Hail; belv. 471. Dalit: parif: \$9:

lantago anguftifolia tnajor. Bazh: pin: 189.

lantago minor; Dod, pempt. IO% us

H É Pian-



[Begin Page: Page 114]

dagopus.

albicans.

alpina,

cretica,

maritima.

“114 TETRANDRIA MONOGYNIA.

(9. *Plantago trinervia*, folio angustifolimo. Bauh. pin. 189.  
prodr. 98 ')

d. *Plantago angustifolia major*, caulium fummitate foliofa.

Bauh. pin. 189.

Habitat in Europe campis flerilibus. t

6. *PLANTAGO foliis lanceolatis*, fpica ovata hirsuta,  
fcapo angulato.

*Plantago angustifolia*, paniculis lagopi. Bauh. piz 189.  
prodr. 98. Morif. hift. 3. f. 8. z. 16. f. 13.

Habitat in G. Narbonenfi, Hifpania, Luftania.

Bracica [. Jquame in fpica furt deniffimo tomentofo-hir-  
Jute; Bafis foliorum pilofa.

7. *PLANTAGO foliis linearilanceolatis hirsutis*, fpica  
cylindrica erecta, fcapo tereti foliis longiore.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus*, fcapo longitudine  
foliorum, fpica oblonga.. Hort. cliff. 37. Roy. lugdb.

401.

*Plantago foliis lanceolato-linearibus*, {capo foliis duplo  
longiore, fpica oblonga. Sauv. monfp. 26. ')

- *Holotium hirsutum albicans majus*. d anb. pin. 190.

*Holotium falmanticense majus*. Claf. hift. x. p. 110.

B. *Holotium hirsutum albicans minus*. Baz. pia. 190.

Habitat in Hifpani F Narbone aridis.

8. *PLANTAGO foliis linearibus planis hirsutis*, fpica ob-  
longa erecta.

*Plantago foliis linearibus*, fpica oblonga. Hall, helv.

UI.

*Hiiden hirsutum nigricans*. Bauk, p:». 1o.

Habitat in Helvetiæ alpibus.

9. *PLANTAGO foliis linearibus*, fcapo brevifimo lana-

to nutante, fpica fubrotunda, fcapo tereti. Hort. chf.

36. Roy, lugdb. 401.



Holofteum f. Leontopodium creticum. Bazh. pin. 190.  
Leontopodium creticum. Claf. hift. 2. p. 11.  
Habitat ia Creta.

10. PLANTAGO foliis femicylindratis integerrimis: |

bafi lanatis, fcapo tereti. F7. Juec. 127.

Plantago fcapo ípicato, foliis linearibus fubtus conve -

xis. FJ. lapp. 63. Lob. obf. 163.

Coronopus. maritimus major. Bauh. pim. 190.

Habitat in littoribus marimis Europam borealis.

Bafis foliorum pilofa eft, unde affinitas [umma fpecierum  
6. 7.

p

ps

dini

### [Begin Page: Page 115]

TÉTRANDRIAÁ MONOGYNIA. fig

6. 7.8.9. 11. fed que wis matura efficeret tam varia?  
an locus; an copula.

it: PLANTAGO foliis fübulatis triquetris rigidis, fcapo /;pvata,  
tereti. Roy. lugdb 4202. — — :

Plantago foliis triangulari-prifmaticis: Gett: flampi 2.  
. 428.

Holofeem, ftrictiffimo folio, minus: Bauh. pix. 191.

Serpentina omnium minima. Lob. ic. 439.

E. Holofeum maiiileufe. Bagh. pin. 190.

Habitat in maritimis Mediterranei arežofis:

+12, PLANTAGO foliis linearibus dentatis, fcapo tereti: Coronopus,

Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. Hert. cliff.

37. £l. Juec. 126.Roy. lugdb: 401. Dalib.parif. 50.

Coconopus fylveiiris hirlutior. Bauh: pin. 150.

Herba ttella. f. Cornu. Cervinum. Dod. pempz. 109.

B. Coronopus hortensis. Baz. piz. 190.

Habitat in Europè glareofis.

13. PLANT ÁGO foliis linearibus fübdentatis, (apo te- /5ftingil;

teti, fpica ovata: bracteis cáriaatis membranaceis. Lefi.

Habitat im Hifpanix collibus agrorumque marginibus. Q

Differt a P. Coronopo gadd fif minor EF praecocior;

Jpicæovata, ejus vero longa. Floribus rarius imbricatis:



an labris navicularibus; ejus ero fubulatit  
angu[H mis pibefcentibus. Staminibus brevioribus,  
Calycis foliolis acuisoribus, colore corolle magis fajto..  
Foliis linearibus, nec lanceolatis, parce dentatis: Sca-

pus pulfus eft. Lef:

4. PLANTAGO fcapo unifloro. Fl. lapp. 64. Fl. fec. sinifera,

128. Dalib. parif: o: l

Plantago floribus femincis fesfilibus ad exortum fcapi u-  
nifori maris: Jaf: acf. 1742. p. 131- t. 7. Guètt.  
flamp. 2. p. 26. EU

Gramen junceum; capitulis quatuor longiffimis filamen-  
us donatis. Pluk: ala. 1580. t. 35. f. 2. Moris: bif.  
3. f. 8. £. 9. f: 30.

abitat ad Europa littora lacumm:

EA B Caule vaiofe, — uU

15. PLANTAGO caule ramofo, foliis integerrimis, fpis P/ligm.

. Cis foliofis. Hort. pf. 29. \*. —

Plantago caule ramofo. Vir. cliff. 9. Roy: lugdb. qoi.

lantago annua, foliis integerrimis , caule tamofe ére-

&o. Hort. cliff: 37. Dalib. parif. 51. 2

H a3 Pfyl-

## [Begin Page: Page 116]

Cynops.

dalcis.

minimus.

officinalis,

16 TETRANDRIA. MONOGYNIA.

Pfyllium majus erectum. Bab. pim. 191.

Habitat in Europe. auffralis fepibus. ©

16. PLANTAGO caule ramofo, foliis dentatis, fpicis  
aphyllis. Hort. upf. 28. Maz. med. so.

Pfyllium diofcoridis vel indicum, foliis crenatis. Bauh.  
pin. 191.

Habitat ia India. ©

SCOPARIA.

1. SCOPARIA. Gez. zov. 1098.



Capraria foliis ternis, corollis quadripartitis. Hort. cliff.  
320. Roy. lugdb. 2301.

Samoloides. Boerh. Insdb. 2. p. 265. \*

Veronica americana erecta frutescens & ramosa. Herm.  
parad. 241. t. 241.

Veronica fruticosa erecta dulcis, hexangulari caule.  
Sloan. hift. Y. p. 195. t. 108. f. 2.

Phyteuoides americanum, flore albo tetrapetalo. Pis.  
alm. 296. t. 21g. f. x.

Habitat in Jamaica, Curaffao. ©

#### CEN TUNCULUS.

1. CENTUNCULUS. Dill. gif. 161. gen. 111. E.N.  
C. 5. app. 92. t. 10. f. 31.

Centunculus foliis alternis ovatis. F/. fzec. 129. Dali).

parif. ya. \*

Anagallisstrum exiguum, foliis lanceolatis alternis.  
AMizcb. gen. 14. t. 18.

Anagallis paludosa minima. Vaill. parif. 12. t. 4.f.2-  
Alfine palustris minima, flocculis abs. Mentz. pug. +

Medes: :

Habitat in Italiæ, Galliæ, Germaniæ; Scaniæ areaofis. O

#### SANGUISORBA.

1. SANGUISORBA foliis ovatis. Hort. cliff. 39. F.

Juec. 130. Mat. med. y1. Roy. lugdb. 240. Dalib. pa

rif. \$1.

Pimpinella fangviforba major. Bauh. pia. 160.

Pimpinella fylveftris f. fangviforba major. Dod. pempt. |

10\$.

B. PIMPINELLA major rigida przalta auriculata fub-  
muda. Bocci, muf: 2. p. 19. z. 7.

Habitat in Europæ pratis ficioribus. x

t

"3. SAN-