



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque
plantarum huc usque cognitarium, juxta methodi naturalis,
normas digesta**

Parisi, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

v.13:pt.1 (1852): <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7162>

Page(s): Title Page, Page 733

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library
Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 8 April 2024 1:24 PM
<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1688747i00007162.pdf>

This page intentionally left blank.

DE CANDOLLE

PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS

SIVE

ENUMERATIO CONTRACTA
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM

HUCUSQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS DIGESTA

EDITORE ET PRO PARTE

AUCTORE

ALPHONSO DE CANDOLLE

PARS DECIMA TERTIA

SECTIO PRIOR

**Sistens Corollifloras supra omissas, nempe Solanaceas, Diapensiaceas
et Plantaginaceas.**

**HERBARIUM
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN**

PARISIIS

SUMPTIBUS VICTORIS MASSON

FORO DICTO DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N° 17

VENITQUE APUD EUMDEM LIPSIAE, PROCURANTE L. MICHELSEN

10 MAI. MDCCC LII.

Broussonet), in Ægypto (Aucher, n. 2716), in Græciâ (Olivier), circa Panormum (Heldreich), Hipponum (Steinheil). P. Coronopus var. Boiss. pl. Hokenacker, n. 197. (v. s. in h. Mus. Par.)

Sectio XVII. PSYLLIUM.

Plantæ annuæ vel fruticulosæ; folia opposita; spicæ capitatæ. — Corollæ tubus transversim plicatus; capsula 2-sperma. — Gerontogææ.

* Fruticulosæ.

188. P. ARBORESCENS (Poir. dict. 5, p. 389), suffruticosa ramosa, ramis dense foliosis, foliis anguste linearibus integris planis vel subulatis vel subcapillaceis glabris vel ciliolatis ad ramulorum apicem parum latioribus et erectiusculis imâ basi ciliatis vel pilis raris inspersis, pedunculis axillaribus gracilibus foliis brevioribus vel longioribus subincanis, spicis rotundatis paucifloris, bracteis acuminatis inferioribus calycem superantibus, superioribus latis apiculatis villosis-ciliatis, foliolis calycinis ovato-ellipticis breviter acuminatis ciliatis, corollæ lobis lanceolatis acutis. § In rupestribus Mesa de Mota in Canariâ. Tripedalis, foliis numerosis subfiliformibus ad ramulorum basin intermixtis distincta. P. arborescens Webb, phyt. Canar. 3, p. 187, t. 195, Rap. l. c. p. 485, Barnd. l. c. p. 49, Pers. syn. 1, p. 140, Rœm. et S. syst. 3, p. 143, Bourgeau pl. Canar. exsicc. n. 525 (Riedlé, Broussonet). (v. s. in h. Mus. Par.)
189. P. MADERENSIS, fruticosa ramosa, ramis dense foliosis, foliis linearibus acutis carnosulis papilloso-scabris vel pubescenti-scabris ad ramulorum apicem latioribus congestis, pedunculis axillaribus erectis superne brevissime puberulis foliis brevioribus vel æqualibus spicis, capitatis paucifloris, bracteis lanceolatis florem æquantibus carnosis subcoriaceis acumine canaliculato papilloso granulato, foliolis calycinis æqualibus ovatis vix acuminatis papilloso-incanis, corollæ lobis ovato-lanceolatis reflexis fusciscentibus. § In insulâ Maderâ (Leman). Differt a P. arborescente foliis puberulis vel papilloso-incanis, bractearum et calycinorum foliolorum fabricâ. P. arborescens var. A, Barnd. l. c. p. 50. Var. α ciliata, foliis anguste linearibus pubescentibus (herb. DC.). (v. s. in h. Mus. Par.)
190. P. WEBBII (Barnd. l. c. p. 50, n. 109), fruticosa ramosissima, incano-velutina, foliis linearibus obtusis integerrimis sulcatis vel subulatis ad ramulorum apicem confertis subconnatis canescentibus velutinis imâ basi ciliolatis, pedunculis axillaribus erectis inferioribus longioribus teretibus incanis folia internodiisque superantibus, spicis rotundatis vel remotifloris, floribus oppositis, bracteis ovatis acuminatis florem subæquantibus velutinis incanis, foliolis calycinis ovalibus posticis margine scarioso latioribus, corollæ lobis ovato-lanceolatis acutis, capsulâ conicâ calycem duplo superante. § In excelsis et apricis rupibus Teneriffæ ad Las Canadas 3200 metr. (Webb.), in reg. alpinâ insulæ Palmæ. (Bourg. pl. Canar. n. 131). Occurrit in hortis sub nomine P. Seetzenii Berh. Herba odore levi hircino redolet. (v. s. in h. Mus. Par.)
191. P. SINICA (Barnd. l. c. p. 49), suffruticosa ramosissima, ramis teretibus pubescenti-viscidis foliosis, foliis linearibus calloso-obtusis integerrimis marginibus revolutis plus minusve angustatis vel subulatis utrinque pubescenti viscidis interdum ad ramulorum basin subbifariam oppositis, pedunculis axillaribus folia superantibus erectis tomentoso-viscidulis, spicis capitatis 2-6-floris, bracteis inferioribus extrorsum viscoso-tomentosis obovatis plus minusve acuminatis superioribus obtusis ovalibus concavis dorso herbaceis viscosis, foliolis calycinis ovatis vel ovalibus margine late scariosis viscidis, corollæ lobis ovatis acutiusculis. § In rupibus ad montis Sinai radices. P. Arabica Boiss. pl. Pinaud exsicc. P. Psyllium? Dcne. florul. Sin. ann. scienc. nat. 2, p. 245, Schimp. pl. Arab. exsicc. n. 172, Auch. exsicc. n. 2711. P. squarrosa Bové pl. Sin. exsicc. n. 47. Desiccatione rufescit. (v. s. in h. Mus. Par.)
192. P. EUPHRATICA (Dcne mss. Barnd. l. c. p. 51, n. 112), suffrutex e basi

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

DE CANDOLLE
PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS
254.1
ENUMERATIO CONTRACTA
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM
HUCUSQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS DIGESTA
EDITORE ET PRO PARTE
AUCTORE
ALPHONSO DE CANDOLLE
PARS DECIMA TERTIA
SECTIO PRIOR
Sistens Corollifloras supra omissas, nempe Solanaceas, Diapensieas
et Plantaginaceas.
» VARY
Dv YORK
2T ANICARM
ERN CIT ERN NEN
PARISIIS
suMPTIBUS VICTORIS MASSON
FORO DICTO DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N° 17
VENITUUB APUD EUMDEM LIPSUE, PROCURANTE L. MICHELSEN
10 MAL, MDCCC LII.

[Begin Page: Page 733]

rLANTACO. PLANTAGINACELE (avcrog DCNE). 1738
Broussonnet, in JEgypto (Aucher, n. 2716), in Grmcià (Olivier), circa
Panormum (Heldreich), Hipponum (Steinheil). P. Coronopus var. Boiss.
pl. Hokenacker, . 197. (v. s. in h. Mus. Par.)
Sectio xvi. PsyLLIUM.
Plante annue vel fruticosoz ; folia opposita; spice capitatz. — Corolla tubus
transversim plicatus; capsula 2-sperma. — Gerontoges.
* Fruticulosa.
188. P. ARBORESCENS (Poir. dict. 5, p. 389), suffruticosa ramosa, ramis dense
foliosis, foliis anguste linearibus integris planis vel subulatis vel subcapillaceis
glabris vel ciliolatis ad ramulorum apicem parum latioribus et erectiusculis
3m& basi ciliatis vel pilis raris inspersis, peduneulis axillaribus gracilibus fo-
liis brevioribus vellongioribus subincanis , spicis rotundatis paucifloris , brac-
teis acuminatis inferioribus ealycem superantibus, superioribus latis apiculatis
villosociliatis, foliolis calycinis ovato-ellipticis breviter acuminatis ciliatis, co-
rolle lobis lanceolatis acutis. 5 In rupestribus Mesa de Mota in Canariá. Tri-
pedalis, foliis numerosis subfilliformibus ad ramulorum basin intermixtis dis-
tincta. P. arborescens Webb, phyt. Canar. 3, p. 187, t. 195, Rap. 1. e. p. 485,
Barnd. 1. c. p. 49, Pers. syn. 1, p. 140, Rom. et S. syst. 3, p. 143, Bourgeau
pl. Canar. exsicc. n. 525 (Riedlé, Broussonet). (v. s. in h. Mus. Par.)
189. P. MADERENSIS, fruticosa ramosa, ramis dense foliosis, foliis linearibus
acutis eurnosulis papilloso-scabris vel pubescenti-scabris ad ramulorum apicem

latioribus congestis, pedunculis axillaribus erectis superne brevissime puberulis foliis brevioribus vel zequalibus spicis, eapitatis paucifloris, bracteis lanceolatis florem zquantibus carnosis subcoriaceis acumine canaliculato papilloso granulato, foliolis calycinis zequalibus ovatis vix acuminatis papilloso-incanis, corollae lobis ovato-lanceolatis reflexis fuscescentibus. 3 In insulá Maderá (Leman). Differt a *P. arborescente* foliis puberulis vel papilloso-incanis, bractearum et calycinorum foliolorum fabricá. *P. arborescens* var. A, Barnd. 1l. c. p. 50. Var. « ciliata, foliis anguste linearibus pubescentibus (herb. DC.). (v. \$8. in h. Mus. Par.)

190. *P. Wrnnil*: (Barnd. 1l. c. p. 50, n. 109), fruticosa ramosissima, incano-velutipa, foliis linearibus obtusis integerrimis suleatis vel subulatis ad ramulorum apicem confertis subconnatis canescentibus velutinis imá basi ciliolatis, pedunculis axillaribus erectis inferioribus longioribus teretibus incanis folia internodiaque superantibus, spicis rotundatis vel remotifloris, floribus oppositis, bracteis ovatis acuminatis florem subzquantibus velutinis incanis, foliolis calycinis ovalibus posticis margine scarioso latioribus, corollae lobis ovato-lanceolatis acutis, capsulá conicá calycem duplo superante. 5 In excelsis et apricis xupibus Teneriffa ad Las Canadas 3200 metr. (Webb.), in reg. alpiná insulze Palma. (Bourg. pl. Canar. n. 131). Occurrit in hortis sub nomine *P. Seetzenii* Berh. Herba odore levi hircino redolet. (v. s. in h. Mus. Par.)

191. *P. S1NA104* (Barnd. l. c. p. 49), suffruticosa ramosissima, ramis teretibus pubescenti-viscidis foliosis, foliis linearibus calloso-obtusis integerrimis marginibus revolutis plus minusve angustatis vel subulatis utrinque pubescenti viscidis interdum ad ramulorum basin subbifariam oppositis, pedunculis axillaribus folia superantibus erectis tomentoso-viscidulis, spicis capitatis 2-6-floris, bracteis inferioribus extrorsum viscoso-tomentosis obovatis plus minusve acuminatis superioribus obtusis ovalibus concavis dorso herbaceis viscosis, foliolis calycinis ovatis vel ovalibus margine late scariosis viscidis, corollae lobis ovatis acutiuseulis. 4 In rupibus ad montis Sinai radices. *P. Arabica* Boiss. pl. Pinarid exsicc. *P. Psyllium?* Don. florul. Sin. gnn. scienc. nat. 2, p. 245, Schimp. pl. Arab. exsicc. n. 172, Auch. exsicc. n. 2711. *P. squarrosa* Bové pl. Sin. exsicc. n. 47. Desiccatione rufescit. (v. s. in h. Mus. Par.)

192. *P. EuPHRATICA* (Dcne mss. Barnd. J. c. p. 51, n. 112), suffrutex e basi