

4. ILLECEBRUM *aristatum*.150 2. POLYCARPAEA *Teneriffae*. *Mollia diffusa* W.1. ——— *carnosa* Sm.

*Polycarpea carnosae* Sm. caule fruticoso, foliis senis carnosis, inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis, stipulis brevissimis lacris. Lk.

2. POLYCARPAEA *linearifolia*.2. ——— *latifolia*. *Mollia latifolia* W.2. ——— *gnaphalodes*.3. ——— *Smithii* Lk.**P. Smithii. Paronychia Smithii**

Ch. Foliis senis linearibus glabris obtusis, stipulis brevissimis, panicula dichotoma, ramulis divaricatis, bracteis ovatis, calyce brevioribus. Steht der *Polycarpea stellata* am nächsten, unterscheidet sich aber durch die Blüthenrispe hinreichend. Lk.

*Paronychia Smithii* Choisy. P. caule suffruticoso, ramulis confertis, foliis lineari-lanceolatis, stipulis bracteisque 1-1½ lineam longis, fasciculis paucifloris. Ch.

## PLANTAGINEAE.

1. PLANTAGO *Coronopus*. P.

Die Pflanze des südlichen Europa. Sie unterscheidet sich etwas von der im nördlichen vorkommenden durch längere Aehren und zarthäufige Bracteen. Lk.

2. PLANTAGO *Lagopus*. P.1. ——— *arborescens*. Brouss.1. ——— *Cynops*. P. E.160 3. ——— *maior*. nE.

## STATIGINAE.

1. STATICE *pectinata* Mass. *bellidifolia* Cav. E.1. ——— *arborea*.

## PRIMULACEAE.

2. \*ANAGALLIS *coerulea*. nE.2. GLOBULARIA *longifolia*. M.2. SAMOLUS *Valerandi*. E. P.

## RHINANTHACEAE.

2. \*VERONICA *Becca Bunga*. nE. P.

Durch Riedlé.

2. \* ——— *agrestis*. nE. P.2. ——— *Anagallis*. nE. P.2. \*BARTSIA *viscosa*. P. E.170 2. \*RHINANTHUS *Trixago*. P.

## ACANTHACEAE.

1. JUSTICIA *hyssopifol.* Mataprieta.

## JASMINEAE.

1. JASMINUM *odoratissimum*. M.1. ——— *pumilum*.3. OLEA *excelsa*. Palo blanco. M.2. ——— *europaea*. E.

## VERBENACEAE.

1. ERANTHEMUM *salsoloides*. *Campylanthus salsoloides* Roth.

Romero marimo. CV.

2. VERBENA *officinalis*. E. P.2. ——— *supina*. E. P.

## LABIATAE.

2. SALVIA *canariensis*.180 1. ——— *egyptiaca*. E.

Von Riedlé bei St. Cruz Herb. im Jardin des plantes.

2. \*SALVIA *verbenaca*. E. P.