

»morum subeymiosis, laciniis calycinis lanceolatis, petalis rhomboideo-
»ovatis calyce brevioribus.«

»Hab. Fuerteventura penins. Handia (Bourg. et Bolle).«

»Rh. Gayana Webb, syn. ined.«

»annua glanduloso-pubescenti caule e basi ramoso ramis filiformibus
»divaricato-diffusis, foliis elongatis linearibus vel filiformibus planis
»enerviis acutis, laciniis calycinis elliptico lanceolatis apice attenuatis
»subacutis margine anguste scariosis, petalis lanceolatis basi cuneatis ex-
»unguiculatis calyce vix longioribus, staminibus ima basi dilatatis 5 calycis
»laciniis oppositis infra insertis, 5 alternis superne insertis brevioribus,
»capsula elongato-ovata calycem vix aut ne vix excedente, seminibus
»rotundato-reniformibus dorso subcanaliculatis, subtiliter striatis nigris.«

»Hab. Fuerteventura, in arena marit. Gr. Tarajal (Bolle).«

Polycarpon L.

P. succulento Phyt. I, 455 in synops. substituitur:

»*P. tetraphyllum* L.«

»v. β . *intermedium* Gay (in Duchat. rev. bot. 2. 372 (*P.*
»*succulentum* Webb l. cit. non DC.).«

»Hab. in arenosis Graciosa.«

»*P. Bivonae* Gay = *alsinaefolium* Webb, Phyt. I, 455 «

»florae nostrae procul dubio alienum.«

Polycarpaea Lamb.

In Synops. ined. Webbius *P. aristatae* suae Phyt. I, 459 T. 24 duas
sequentes species substituit:

»*P. tenuis* Webb, synops. ined. (*P. aristata* Webb l. cit. nec
»Chr. Smith.)«

»sericeo-tomentosa albescens, caule debili erectiusculo ramis te-
»nuissimis foliis elongatis filiformibus aristatis, calycis foliolis lineari-
»lanceolatis, late scariosis acuminatis, seminibus punctulatis.«

»Hab. In Teneriffae Las Cañadas sub monte La Montaña blanca. A b.
Hillebr. etiam in collinis ins. Palmae locis Argual et Fuencaliente reperta.

P. aristata Chr. Smith in DC. prodr. III, 373.

»niveo-tomentosa vel cinerascens caule elongato diffuso, foliis lanceo-
»latis vel lineari-lanceolatis acutissimis aristatis, calycis laciniis lanceo-
»latis late scariosis acuminatis seminibus laevibus.«

»Hab. filo de las Cañadas ad fauces La Angostura Chr. Sm. Arenas
»negras (Bourg.) Barr. Chinico et Badajoz prope Guimar (Bourg.) Canaria «

»La Cumbre Chr. Sm.«

Additurque nova species:

»*P. filifolia* Webb, syn. ined. (*P. linearifolia* Buch, Besch. 442? «
non DC. *P. filifolia* Webb in schea. Bourg. 530.)«

»caule suffruticoso ascendente? ramis rectis gracilibus nodosis juni-
»oribus pedunculisque floccoso-pubescentibus, foliis filiformibus car- «