



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive,  
Enumeratio contracta ordinum generum specierumque  
plantarum huc usque cognitarum, juxta methodi naturalis,  
normas digesta**

Parisii, Sumptibus Sociorum Treuttel et Wurtz, 1824-73

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/286>

**v.6 (1837):** <https://www.biodiversitylibrary.org/item/7155>

Page(s): Title Page, Page 663, Page 664

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 18 April 2024 5:54 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1692692i00007155.pdf>

This page intentionally left blank.

PRODROMUS  
SYSTEMATIS NATURALIS  
REGNI VEGETABILIS,  
SIVE  
ENUMERATIO CONTRACTA  
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM  
HUC USQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS  
DIGESTA;

AUCTORE AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.

PARS SEXTA :

Sistens Compositarum continuationem.

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

PARISIIS,

Sumptibus Sociorum TREUTTEL ET WÜRTZ,  
viâ dictâ de Lille, n° 17.

VEVITQUE IN EORUMDEM BIBLIOPOLIO,

ARGENTORATI.



M. DCCC. XXXVII.

1. *serrata*, foliis minoribus angustioribus laxè subtomentosis, margine serraturis paucis instructis. — in deserto Caspico propè Kislar legit cl. Godet. *Acrop. serratum* Cass. l. c. (v. s.)
2. A. REPENS, ramis 1-cephalis infrà capitulum nudis intervallo folii supremi longitudini æquali. ¶ in Oriente. *Centaurea repens* Linn. sp. 1233. *Jacea orientalis* cyani folio flore parvo calyce argenteo Tourn. cor. 92. *Acr. angustifolium* Cass. l. c.? Valdè similis var. β prioris. (v. s. ex patr. ign.)

DCXCIII. RHAPONTICUM. — *Rhaponticum* et *Serratulæ* sp. *DC. mem. comp. p. 21.* — *Rhaponticum*, *Stemmacantha* et *Cestrinus* *Cass. dict. 41. p. 309 et 320. 50. p. 460.* *Rhapontici* sect. 3<sup>a</sup> *Less. syn. p. 6.* — *Hookia Neck. elem. n. 122?* — *Centaureæ Cnici et Cynaræ* sp. *Linn.* — *Rhacomæ* sp. *Adans.* *Serratulæ* sp. *Gærtn. fr. 2. p. 380.* — *Centaurium* *Hall. helv. 1. p. 69.*

Capitulum homogamum multi- et æqualiflorum. In vol. squamæ multiseriales adpressæ, desinentes in appendicem totam aut margine scariosam integrum dentatam acuminatam aut rotundatam. Recept. fimbriulis linearibus onustum. Cor. 5-fidæ subregulares. Stam. filam. papillosa, anth. appendice terminali obtusâ. Fructus oblongus bilaterali-ter compressus glaber, areolâ basilari valdè obliquâ. Pappus rufescens multiserialis, setis rigidis scabridis, exterioribus gradatim brevioribus. — Herbæ perennes oligocephalæ aut monocephalæ. Folia indivisa aut variè pinnatilobata, sæpius subtùs cano-tomentosa. Capitula magna subglobosa. Cor. purpureæ. — Accedit ad *Centaureas* areolâ subobliquâ sed flosculi omnes æquales et hermaphroditi : ad *Serratulam* sed involuci squamæ in appendicem planam membranaceam expansæ : ad *Leuzeam* sed pappus scaber nec plumosus. *R. scariosum* habitu ad *cynaroidem* et *R. uniflorum* ad *acaulem* vergunt et genera tria *Cassiniana* jungunt. Pappi setæ basi in variis plus minus conferruminatæ, magis in *R. atriplicifolio* et *Canariensi*, minus aut vix in *R. scariose*.

### Sect. I. STEMMACANTHA. — *Stemmacantha* *Cass. ll. cc.*

Involuci squamæ desinentes in appendicem longam acuminatissimam margine tantum scariosam. Fructus margine subdentato circà basin pappi coronatus.

1. R. ATRIPLICIFOLIUM, foliis petiolatis denticulatis, radic. et infer. cordatis acuminatis subangulatis, superioribus ovato-oblongis, capitulis paucissimis cernuis, involuci squamis angustis acuminatis subintegerrimis. ¶ in sylvis Dahuriae. *Carduus atriplicifolius* Trev. act. nat. cur. 13. p. 1. p. 198. Horn. suppl. 92. Reichenb. hort. bot. 1. t. 18. *Silybum atriplicifolium* Fisch. ind. hort. petr. 1824. *Onopordon deltoides* Ait. kew. 3. p. 146. ex Spreng. syst. 3. p. 286. *Stemmacantha ficifolia* Turcz. in litt. 1832. (v. s.)

β. foliis inciso-lobatis. *Cirsium sicifolium* Fisch. men. soc. imp. mosc. 3. p. 69.

2. R. CYNAROIDES (*Less. syn. p. 6*), foliis amplis oblongis aut ovatis basi attenuatis apice acuminatis, inferioribus pinnatipartitis, superioribus vix pinnatifidis, omnium lobis acutè dentatis, capitulis paucissimis erectis, invol. squamis serrato-ciliatis. ¶ in Pyrenæorum centralium pratis asperis. *Cnicus centauroides* Linn. sp. 1157. Willd. sp. 3. p. 1685. *Cnicus inermis* Willd. sp. 3. p. 1672 ex Spreng. *Cnicus Cynara* Lam. fl. fr. 2. p. 14. *Serratula cynaroides* DC. fl. fr. ed. 3. n. 3030. diss. comp. 3. *Serratula cynarifolia* Poir. dict. 6. p. 561. *Stemmacantha cynaroides* Cass. dict. 50. p. 460. — *Moris. ox. s. 7. t. 25. f. 2.* Synon. *Georgii* hue à pluribus relatum videtur excludendum. (v. v. sp.)

Sect. II. EURHAPONTICUM. — Rhaponticum DC. diss. in ann. mus. 16. p. 168. Cass. dict. 41. p. 309. Poir. dict. sc. nat. 45. p. 315.

Involuci squamæ exteriores desinentes in appendicem amplam oblongam aut subrotundam omnino scariosam subintegram aut demum ruptu laceram, interiores angustiores linear-lanceolatae acuminatissimæ.

3. R. NITIDUM (Fisch.! in litt. 1833), totum glaberrimum, caule erecto striato 1-cephalo, foliis petiolatis pinnatisectis, segmentis ovalibus oblongis indivisis aut sublobatis acutè cartilagineo-serratis, invol. squamis in appendicem amplam scariosam subrotundam plerisque dilatatis. — in littore orientali maris Caspii legit cl. Karelín. Collum sublanatum. Folia glauca utrinque glabra. Capitulum ferè R. scariosi. Folia referunt Centauream Africanam. (v. s. comm. à cl. Fisch.)
4. R. SCARIOSUM (Lam. fl. fr. 2. p. 38. DC diss. p. 32), foliis suprà glabris subtus cano-tomentosis, inferioribus petiolatis ovatis cordatisve denticulatis, mediis breviùs petiolatis ovato-oblongis, summis sessilibus oblongis utrinque acuminatis vix dentatis. ♂ in pratis asperis et collibus Alpium à Sabaudiâ et Helvetiâ ad Galloprovinciam et Pedemontium. Centaurea Rhapontica Linn. sp. 1294. Serratula Rhaponticum DC. fl. fr. ed. 3. n. 3081. — Dalech. lugd. 1701. f. 1. Lob. ic. t. 288. f. 2. (v. v. sp.)  
♀. *lyratum*, foliis radicalibus lyratis petiolis nempè appendices foliaceas oblongas interruptè gerentibus, caulinis subpinnatifidis. ♂ in montibus Pedemontii et Helvetiæ. Centaurea lyrata Bell. app. fl. ped. p. 40. — Hall.! helv. n. 160. (v. s. in mus. bot. hort. Genev.)
5. R. UNIFLORUM (DC. diss. comp. p. 33), foliis omnibus pinnatipartitis vix arachnoideis, lobis oblongis dentatis, caule simplici 1-cephalo ferè usque ad apicem folioso. ♂ in montosis Sibiriæ cis et transbaicalensis, in Dahuriâ, et circà Pekinum (Bunge!). Centaurea membranacea Lam. ex Steud. nom. Cnicus uniflorus Linn. mant. 572. Serratula uniflora Spreng. syst. 3. p. 388. Leuzea Dahurica Bunge! enum. pl. chin. n. 205. — Gmel. sib. 2. p. 86. t. 38. Involuci squamæ exteriores sublaceræ, interiores paucæ minus quam in priore acuminatæ. Variat in siccis semipedalis magis lanuginosa, in pinguioribus pedalis magis glabrata. (v. s.)
6. R. PULCHRUM (Fisch. et Mey.! ind. sem. h. petrop. 1835. p. 36), foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, omnibus pinnatipartitis suprà glabriusculis subtus cano-tomentosis, lobis ovatis calloso-denticulatis, ultimis confluentibus, caule simplici 1-cephalo sub capitulo aphylo. ♂ in Caucasi altioribus montibus Talusch alt. 670. hexap. Canlis et folia juniora supernè arachnoidea, invol. squamæ siccæ glabræ apice rotundatae integræ, intimæ lineares acuminatæ ciliatae. (v. s. comm. à cl. auct.)
7. R. CANARIENSE, foliis omnibus pinnatipartitis utrinque lanato-tomentosis, lobis oblongis nervosis dentatis, caule simplici 1-cephalo subcapitulo aphylo. — in insul. Canariensibus. Centaurea cynaroides Link in Buch can. 147. Differt à Leuzeâ (quâcum jungit cl. Sprengel) pappo densè et longiusculè equidem barbellato non verè plumoso, subrufo nec albissimo et insuper tertiatâ parte breviore, capitulo globoso nec conico, etc. Proxime accedit ad R. uniflorum sed notis indicatis et squamis involuci albissimis nec rufis et patriâ diversissimâ differt. (v. s. in h. cl. Webb et Berthelot.)

Sect. III. CESTRINUS. — Cestrinus Cass. dict. ll. cc. et v. 8. p. 24.

Involuci squamæ oblongæ apice summo expansæ in appendicem ovalem scariosam laceram.

8. R. ACAULE, foliis pinnatisectis, lobis pinnatifidis aut grossè dentatis, capitulo ad collum sessili. ♂ in collibus incultis apricis Barbariæ (Desf.?) et in insul. Cypri (Sibth. prod. 2. p. 158). Cynara acaulis Linn. sp. 1160. Desf.! fl. atl. 2. p. 249. t. 223 excl. Tourn. syn. Lam. ill. t. 663. f. 2. Cynara humilis Juss.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

PRODROMUS  
SYSTEMATIS NATURALIS  
REGNI VEGETABILIS,  
SIVE  
ENUMERATIO CONTRACTA  
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM  
HUG USQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS  
DIGESTA ;  
Avucrong AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.

.

PARS SEXTA:  
Sistens Compositarum continuationem.

] RC AE  
BOT AISICAT.  
GARÜEN  
PARSIIS,  
Sumptibus Sociorum TREUTTEL zr WÜRTZ,  
víá dictá de Lille, n? 17.  
VEJITQUE IN EORUMDEM BIBLIOPOLIO ,  
ARGENTORATI.  
AZ I AA  
M. DCCC. XXXVII.

[Begin Page: Page 663]

ACROPTILON. COMPOSIT/E-CYNARE/E. 663  
», serrata , foliis minoribus angustioribus laxé subtomentosis , margine ser-  
raturis paucis instructis. — in deserto Caspico propé Kislar legit cl. Godet.  
Acrop. serratum Cass. l. v. (v. s.)  
2. Å. nEPENS, ramis ri-cephalis infrà capitulum nudis intervallo folii suprem'  
longitudini equali. 25 in Oriente. Centaurea repens Linn. sp. 1233. Jacea  
orientalis cyani folio flore parvo calyce argenteo Tourn. cor. 92. Åcr. angusti-  
folium Cass. 1l. c.? Valdé similis var. £ prioris. (v. ». ex patr. ign.)  
DCXCIII. RHAPONTICUM. — Rhaponticum et Serratule sp. DC. mem.  
comp. p. 21. — Rhaponticum, Stemmacanba et Cestrinus Cass. dict. 41.  
p. 309 et 320. 50. p. 460. Rhapontici sect. 3a Less. sy. p. 6. — Hookia JVecá.  
elem. n. x22? — Centaurex Cnici et Cynarz sp. Linn. — Rhacomae sp. 4fdans.  
Serratule sp. Gertn. fr. 4. p. 380. — Centaurium Hall. hely. 1. p. 69.  
Capitulum homogamum multi- et &qualiflorum.In vol. squame mul-  
liseriales adpresse, desinentes in appendicem totam aut margine sca-  
riosam integrum dentatam acuminatam aut rotundatam. Recept. fim-  
brillis linearibus onustum. Cor. 5-fidz subregulares. Stam. filam. pa-  
pillosa, anth. appendice terminali obtusá. Fructus oblongus bilateraliter  
compressus glaber, areolá basilarí valdé obliquá. Pappus rufescens  
multiserialis , setis rigidis scabridis , exterioribus gradatim brevioribus.  
— Herba perennes oligocephale aut m noces Folia indivisa aut  
varié pinnatilobata, sepius subtüs cano-tomentosa. Capitula magna  
subglobosa. Cor. purpurez. — Accedit ad Centaureas aveolà subobli-  
qué sed flosculi omnes :quales et hermaphroditæ : ad Serratulam sed

involucri squamz in appendicem planam membranaceam expansa : ad Leuzeam sed. pappus scaber nec plomosus. R. scariosum babitu ad cynaroidem et R. uniflorum ad acaulem vergunt et genera tria Cassiniana jangunt. Pappi sete basi in variis plus minus conferruminate , magis in KR. atriplicifolio et Canariensi, minus aut vix in R.. scariose.

Sect. 1. SrEMMACANTHA, — Stemmacantha Cass. UH. cc.

Involucri squamz desinentes in appendicem longam acuminatissimam margine tantum scariosam. Fructus margine subdentato circà basin pappi coronatus.

1. R. ATRIPLICIFOLIUM, foliis petiolatis denticnatis, radic. et infer. cordatis acuminatis subangulatis, superioribus ovato-oblongis , capitulis paucissimis cernuis, involucri squamis angustis acuminatis subintegerimis. 2f in sylvis Dahu-ri». Carduus atriplicifolius Trev. act, nat. eur. 13. p. zr. p. 198. Horn. suppl.

92. Reichenb. hort. bot. 1. t. 18. Silybum atriplicifolium Fisch. ind. hort.

petr. 1824. Onopordon deltoides Ait. kew. 3. p. 146. ex Spreng. syst. 3.

p- 286. Stemmacantha ficifolia Turcz.! in litt. 1832. (v. s.)

£. foliis inciso-lobatis. Cirsium ficifolium Fisch. men. soc. imp. mosc. 3.

p. 69. :

z. R. cvNaROrDpz (Less. syn. p. 6), foliis amplis oblongis aut ovatis basi attenuatis apice acuminatis, inferioribus pinnatipartitis, superioribus vix pinnatifidis, omnium lobis acute dentatis, capitulis paucissimis erectis, invol. squamis serrato-ciliatis. 2 in Pyrenzorum centralium pratis asperis. Cnicus centauroides Linn. sp. 1157. Willd. sp. 3. p. 1685. Cnicus inermis Willd. sp. 3.

p- 1672 ex Spreng. Cnieus Cynara Lam. fl. fr. 2. p. 14. Serratula cynaroides DC. fl. fr. ed. 3. n. 303o. diss. comp. 3. Serratula cynarifolia Poir. dict. 6.

p. 561. Stemmacantha cynaroides Cass. dict. 50. p. 460. — Moris. ox. ». 7.

t. 25. f. 2. Synon. Georgii huc à pluribus relatum videtur excludendum. ( v. v. Sp.)

## [Begin Page: Page 664]

664 DICOTYL. seu EXOGEN.E. RHAPONTICUM,

Sect. 1. Eunnarowricum. — Rhaponticum. DC. diss. in ann. mus.

16. p. 168. Cass. dict, 41. p. 309. Poir. dict. sc. nat. 45. p. 315.

Involucri squamz exterieores desinentes in appendicem amplam oblongam aut subrotundam omnino scariosam subintegram aut demum ruptu laceram, interiores angustiores linear-lanceolate acuminatissimz.

2 /

3. R. urriDum (Fisch.! in litt. 1833), totum glaberrimum , caule erecto striato 1-cephalo, foliis petiolatis pinnatisectis, segmentis ovalibus oblongis indivisis aut sublobatis acuté cartilagineo-serratis, invol. squamis in appendicem amplam scátiosam subrotundam plerisque dilatatis. — in littore orientali maris Caspii legit cl. Karelín. Collum sublanatum. Folia glauca utrinque glabra. Capitulum feré R. scariosi. Folia referunt Centauream Africanam. (v. s. comrn. à c]. Fisch.)

4. R. scanrosuxw (Lam. fl. fr. 2. p. 38. DC. diss. p. 32), foliis suprà glabris sub-tüs cano-tomentosis , inferioribus petiolatis ovatis cordatisve denticulatis, mediis breviis petiolatis ovato-oblongis , summis sessilibus oblongis utrinque acuminatis vix dentatis. 2f in pratis asperis et collibus Alpium à Sabaudià et Helvetiá ad Galloprovinciam et Pedemontium, Centaurea Rhapontica Linn.

Sp. 1294. Serratula Rhaponticum DC. fl. fr. ed. 3. n. 3081. — Dalech. lugd.

1701. £. 1. Lob. ic. t. 288. f£. 2. (v. v. sp.)

E. lyratum, foliis radicalibus lyratis petiolis nempé appendices foliaceas

oblongas interrupte gerentibus, caulinis subpinnatifidis. 25 in montibus

Pedemontii et Bugs Centaurea lyraia Bell. app. fl. ped. p. 4o. — Hall.! helv. n. 160. ( v. s. in mus. bot. hort. Genev.)

5. R. uxurronux (DC. diss. comp. p. 33), foliis omnibus pinnatipartitis vix

arachnoideis, lobis oblongis dentatis, caule simplici r-cephalo feré usque ad apicem folioso. 2L in montosis Sibiri; cis et transbaicalensis, in Dahuriá, et circà Pekinum (Bunge! ). *Centaurea membranacea* Lam. ex Steud. nom. Cnicns uniflorus Linn. mant. 572. *Serratula uniflora* Spreng. syst. 3. p. 388. *Leuzea Dahnrica* Bunge! enum. pl. chin. n. 205. — Gmel. sib. 2. p. 56. t. 38. Involucri squamae exteriores sublacerze, interiores paucae minùs quàm in priore acuminatz. Variat in siccis semipedalis magis lanuginosa, in pinguioribus pedalis magis glabrata. (v. s.)

6. R. rurcmnumx (Fisch. et Mey.! ind. sem. h. petrop. 1835. p. 36), foliis radicibus petiolatis, caulinis sessilibus, omnibus pinnatipartitis suprà glabriusculis subtüs cano-tomentosis, lóbis ovatis. calloso-denticulatis, ültinis confluentibus, caule simplici 1-cephalo sub capitulo aphylo. 27 in Caucasi altioribus montibus Talüsch alt. 670. hexap. Cauliset folia juniora superné arachnoidea, invol. squam: e sicczz glabre apice rotundate integre, intima lineares acuminata ci- liata. (v. s. comm. à el. auct.)

7. R. CanxaRiENSz, foliis omnibrz pinnatipartitis utrinque lanato-tomentosis, lobis oblongis nervosis dentatis, càule simplici 1-cephalo subcapitulo aphylo. — in insul. Canariensibus. *Centaurea cynaroides* Link in Buch can. 147. Differt à Leuzeà (quácum jungit cl. Sprengel) pappo densé et longiusculé equidem barbellato non veré plumoso, subrufo nec albissimo et insuper tertìa pàrte breviore, capitulo globoso nec conico, etc. Proxime accedit ad R. unilorum sed notis indicatis et squamis involucri albissimis nec rufis et patrià diversissimá differt. (v. s. in h. cl. Webb et Berthelot.)

Sect. ix. Orsrmimus. — *Cestrinus* Cass. dict. II. cc. et v. 8. p. 24.

Involueri squamz oblongz apice summo expànsz in appendicem ovalem sca- riosam laceram.

8. R. AcAUzE, foliis pinnatisectis, lobis pinnatifidis aut grossé dentatis, capitulo ad, collum sessili. 27 in collibus in cultis apricis Barbariz (Desf.?) et in insul. Cypri (Sibth. prod. 2. p. 158). *Cynara acaulis* Linn. sp. 1160. Desf.! fl. atl. 2. p. 249. t. 223 excl. Tourn, syn. Lam. ill. t. 663. f. 2. *Cynara humilis* Juss.