

#### 4. *Roemeria* Medik.\*

[Roeméria f. – Johann Jakob Roemer (1763-1819), naturalista suizo]

Hierbas anuales con látex amarillo, espeso. Tallos erectos, pubescentes. Hojas pinnatisectas o pinnatipartidas. Flores actinomorfas, pediceladas, solitarias, terminales y axilares. Pétalos 4, de prefloración corrugada, enteros, fugaces. Estambres numerosos, con las anteras elipsoidales. Ovario sin estilo, con 2-4 estigmas. Cápsula silicuiforme, unilocular, lisa, dehiscente del ápice hasta casi la base mediante (2)3-4(6) valvas. Semillas ovoidales o reniformes, alveolado-reticuladas, sin arilo.

*Bibliografía.*—F. FEDDE in A. ENGLER, Pflanzenr. 40: 238-244 (1909).

##### 1. *R. hybrida* (L.) DC., Syst. Nat. 2: 92 (1821)

[híbrida]

*Chelidonium hybridum* L., Sp. Pl.: 506 (1753) [basión.]


*R. violacea* Medik. in Ann. Bot. (Usteri) 3: 15 (1792), nom. illeg.

*Ind. loc.*: “Habitat in Europa australiore”

*lc.*: Lám. 141

Verde o glaucescente, con pelos largos, esparcidos. Tallos (5)20-40(50) cm, erectos, ramificados, rara vez simples. Hojas (1)2-12(20) × 0,5-5(8) cm; las ba-

\* J. Paiva



Lám. 141.—*Roemeria hybrida*, Castronuevo, Zamora (MA 248617): a) hábito; b) detalle de un segmento foliar; c) botón floral; d) estambre; e) flor desprovista de perianto; f) ápice del fruto inmaduro; g) porción apical de la cápsula abierta; h) corte transversal de la cápsula; i) semilla.

5. *Glaucium*

sales, en roseta, pecioladas, pinnatífidas o 1-2 pinnatisectas, raras veces subenteras, con segmentos lineares, aristados; las caulinares, 2-3 pinnatisectas, raramente pinnatífidas. Pedúnculos (1)2-5(8) cm. Sépalos (8)10-13(15) × 5-8 mm, ovados. Pétalos 15-30 × (10)12-20 mm, de obovados a suborbiculares, azul-violáceos, con mancha oscura basal. Filamentos estaminales filiformes y anteras amarillas o azuladas. Cápsula (2)5-10 × 0,2-0,3 cm, cilíndrica, estriada, ± hispida. Semillas c. 1 mm de diámetro, cenicientas.  $2n = 22^*$ .

Arvense o ruderal, sobre todo en substratos básicos; 0-1200 m. IV-VII. S de Europa y N de África. Dispersa por el territorio español excepto el NW. (**And.**) **Esp.:** A Ab Al B (Bi) Bu (C) Ca Cc (Co) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu (Na) O P PM[Mill (Ib) Formentera] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. **N.v.:** amapola morada, amapola violeta, ababol morado, rosetas; **cat.:** rosella morada, rosella de penitents.

*Observaciones.*—No extrañaría su presencia en Portugal (Trás-os-Montes y Beira Alta). La única referencia conocida es de P. COUTINHO (Fl. Portugal: 244, 1913).