

46. *S. VERBASCIFOLIA* (Bieb. Fl. Taur. Cauc. 3. 24), caule herbaceo erecto viscoso-villoso, foliis infimis petiolatis ample ovatis basi cordatis sinuato-lobatis erosis crassis rugosissimis supra vix lanatis subtus niveis tomentoso-lanatis, floralibus latissimis acuminatis concavis persistentibus villosis calyces subaequantibus, racemis subpaniculatis, verticillastris 2-6-floris approximatis distinctis summis abortivis, calycibus campanulatis striatis viscoso-villosis, labio superiore tridentato, inferiore bifido, dentibus omnibus acutis vix spinosis, corollis calyce duplo longioribus, tubo inclusu, fauce ventricosa, labio superiore maximo falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis, connectivis postice deflexis abrupte dilatatis bicornutis extremitate callosa connatis.

S. candidissima. Bieb. Fl. Taur. Cauc. 1. 21. non Vahl.

Hab. in Asiae regionis Caucasicæ sterilibus! in collibus Iberiae Caucasicæ orientalis et ad torrentes Samur et Jacharibasch ditionis Cubensis Bieberstein, in lapidosis siccis altiorum montium Taluisch C. A. Meyer, prope Tiflim herb. Lambert! (h. s. sp. comm. a cl. Prescot.)

S. argentea maxime affinis, differt statura humiliore, foliis basi cordatis nec angustatis, lana breviore tomentosa, paniculis minus ramosis, et verticillastris magis approximatis. Corolla paulo minor. Connectiva postice supra dilatationem subulato-dentata, appendicula supra bicornuta.

47. *S. BROUSSONETI*, caule herbaceo erecto subviscoso-villoso, foliis petiolatis ample ovatis obtusis sinuato-crenatis basi cordatis crassis

rugosissimis supra viridibus subglabris subtus niveo-tomentosis venis viscoso-pubescentibus, floralibus ovato-lanceolatis acuminatis concavis viridibus hispidis persistentibus calyce sublongioribus, racemis paniculatis, verticillastris subsexfloris distinctis, calycibus campanulatis hispidis, labiis patentibus, superiore 3-dentato, dentibus ovatis acutis, medio abbreviato, corollis calyce vix duplo longioribus, tubo inclusu, labio superiore falcato compresso, inferioris lobis lateralibus oblongis erectis, connectivis postice deflexis abrupte dilatatis extremitate callosa connexis.

Hab. in Teneriffa? vel in Africa boreali? *Broussonet!** (v. s. sp. in herb. Lambert.)

Species distinctissima, affinis *S. verbascifolia*; sed foliis amplioribus supra lana destitutis, panícula densiore ramosiore villosissima, foliis floralibus angustioribus, floribus minoribus, et aliis notis differt.

48. *S. MOORCROFTIANA* (Wall.; Benth. in Wall. Pl. As. Rar. 1. 67), caule herbaceo erecto basi lanato superne viloso-viscoso, foliis infimis longe petiolatis ample ovatis eroso-crenatis basi angustatis rugosis supra villosis subtus albo-lanatis, floralibus latissimis acuminatis concavis persistentibus calyces aequalibus, racemis paniculatis, verticillastris remotis subsexfloris, calycibus campanulatis striatis aspero-vilosis, labio superiore 3-dentato, inferiore bifido, dentibus omnibus subulato-mucronatis, corollis calyce triplo longioribus, tubo longe exerto sub