

superne pilis reflexis albis vestitus. Folia ovata, acuta, rugosa, serrata, basi acuta; petiolis basi utrinque obtuso mucrone prominentibus. Spica tetragona, imbricata Bracteis ovatis, longitudine calycum, ciliatis. Calyces sub singula squama sæpe 5, ore tridentati, acuti, dente superiore solitario; inferioribus duobus. Corolla carulea: limbo longitudine calycis: galea brevior subvillosa; labio inferiore trifido, obtuso, integerrimo, basi maculis 2. pallidis.

- indica.* 17. SALVIA foliis cordatis acute crenatis: summis sessilibus, verticillis subnudis remotissimis. *Roy. lugdb.* 15. Sclarea indica, floribus variegatis. *Tournef. inst.* 179. *Habitat in India.*
- verticillata.* 18. SALVIA foliis cordatis crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio inferiore incumbentibus. *Hort. upf.* 11. *
Salvia foliis cordato-sagittatis dentatis. *Hort. cliff.* 495. *Roy. lugdb.* 309
Horminum sylvestre latifolium verticillatum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Austriæ, Misniæ cultis & ruderatis. ☉
- glutinosa.* 19. SALVIA foliis cordato-sagittatis ferratis acutis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upf.* 11. *Roy. lugdb.* 308. *Sauv. monsp.* 146.
Horminum luteum glutinosum. *Bauh. pin.* 238.
Habitat in Europæ lutosis. ♀
- canariensis.* 20. SALVIA foliis hastato-triangularibus oblongis crenatis obtusis. *Hort. cliff.* 13. *Hort. upf.* 10. *Roy. lugdb.* 308.
Horminum canariense tomentosum, hastato folio. *Morif. hist.* 3. p. 394. f. 11. t. 13. f. 17.
Habitat in Canariis. ♀
- ufr. carulea.* 21. SALVIA foliis subrotundis ferratis: basi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana frutescens, folio scorodoniæ, flore violaceo. *Comm. hort.* 2. p. 181. t. 91.
Habitat ad Cap. b. spei, locis argillosis. ♀
- ufr. lutea.* 22. SALVIA foliis subrotundis integerrimis: basi truncatis dentatis. *Hort. cliff.* 13. *Roy. lugdb.* 308.
Salvia africana frutescens, folio subrotundo glauco, flore magno aureo. *Comm. hort.* 2. p. 183. t. 92.
Habitat ad Cap. b. spei juxta rivulos ♀

23. SAL-