

I. ULIGINOSA Stev. = *Pulicaria uliginosa*.

I. UNDULATA Linn. = *Pulicaria undulata*.

I. VILLOSA Vahl. = *Pulicaria Arabicæ*.

CCXXXIV. SCHIZOGYNE Cass. dict. 56. p. 23. Less. syn. 123. — *Conyzæ et Chrysocomæ sp. auct.* — *Gnaphalii sp. Poir.*

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. omnibus tubulosis, marginalibus paucis 1-seriatis tenuibus bidentatis foemineis, cæteris 5-dentatis hermaphroditis. Recept. nudum angustum. Invol. oblongo-obconicum imbricatum, squamis colorato-scariosis oblongis acutis serulatis glabris ciliolatis. Antheræ basi breviter bisetæ. Achænum oblongo-cylindraceum glabriuscum. Pappus 1-serialis setosus scabridus. — *Frutex Canariensis ramosissimus*. Folia sparsa sessilia linearia obtusa integerrima. Corymbi terminales subpaniculati polyccephali. Pedicelli squamułosi. Invol. citrina. Flores intensius lutei. — Genus differt à *Conyzæ* et *Phagnalo* floribus foemineis uni- nec multiserialibus, à *Chrysocomæ* floribus non omnibus hermaphroditis. Ex antheris bisetoso-caudatis accedere videtur ad *Inulam* sed facile differt capitulis non radiatis, involucro imbricato, etc.

1. *S. SERICEA*, ramis foliisque tomento albo subsericeo undique obtectis. ♂ in insulis Canar. Teneriffa, Palmæ, magnâ Canariâ legerunt et mecum comm. cl. Collignon, Ledru, Broussonet, Bory, Chr. Smith, Webb. et Berthelot, fortè etiam ex h. Puer. in insulis Azoricis sed non in ins. Mauritii aut ad Cap. Bonaparte quidquid dixerit cl. Cassini. *Conyzæ sericea* Ait. kew. 3. p. 183. L'Hér. descr. mss. Link. Boch! can. 165. *Chrysocomæ sericea* Linn. f. suppl. 36o. *Conyzæ tenuifolia* Salisb. prod. 194. *Conyzæ canescens* Bory! in litt. Sch. obtusifolia Cass. I. c. ips. test. in h. Merat. *Gnaphalium multiflorum* Poir. f. suppl. 2. p. 803 (ex specim. Ledru) et ideo *Gnaph. Teneriffæ* Spreng. syst. 3. p. 458. *Gnaphalium compressum* Poir. suppl. 2. p. 804 (ex specim. Brousson.) ipso auctore teste et autogr. in h. Desf! Variat involucro glaberrimus aut extus suburaneosis. Cortez sapore acri contra odontalgiam ab incolis usitatus ex Linn. (v. s.)

2. *S. GLABERRIMA*, ramis foliisque glaberrimis. ♂ in insul. Canariensis verisim. Teneriffa. *Conyzæ Chrysocomæ linosyridi* affinis Webb et Berth. herb. Priori sinuillima et forte varietas. Differt tamen glabritate perfectâ, foliis paulò brevioribus, corymbis oligocephalisis. (v. s. in h. Webb. et Berth.)

CCXXXV. VARTHEMIA.

Capitulum multilorum homogamum, fl. omnibus tubulosis 5-dentatis hermaphroditis. Recept. alveolatum. Invol. obovatum imbricatum, squamis adpressis acutiusculis gradatim longioribus, intimis disco æquibus. Antheræ basi bisetæ. Stigmata brevia inclusa. Achænum compressum oblongum pubescens. Pappus 1-serialis, setis subscabridis. — *Suffrutex Persicus erectus ramosissimus glaberrimus*. Folia sparsa pauca linearia aut oblongo-linearia integerrima patulo-dellexa. Capitula ad apices ramorum solitaria. Flores lutei. — Ex capitulis homogamis ad *Chrysocomam*, ex antheris basi bisetis ad *Inulam* accedit. — Genus dicitur veteri peregrinatori Lud. de Varthemo, qui ineunte seculo sexdecimo Persiam et Orientem ferè totum peragrat.

1. *V. PERSICA*. ♂ in Persia prope Teheran leger. cl. Olivier et Bruguière et recentius cl. Belanger. (v. s.)