



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli a Linne ... Systema vegetabilium :secundum classes, ordines, genera, species. Cum characteribus, differentiis et synonymiis

Stuttgardiae, Sumtibus J.G. Cottae, 1817-1830

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/825>

v.7 pt.1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/15273>

Page(s): Page [I], Page 566

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 12 April 2024 7:10 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1690967i00015273.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆ,

EQUITIS,

SYSTEMA VEGETABILIIUM

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,

GENERA, SPECIES;

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS

ET

SYNONYMIIS.

EDITIO NOVA, SPECIEBUS INDE AB EDITIONE XV. DETECTIS
AUCTA ET LOCUPLETATA.

VOLUMINIS SEPTIMI PARS PRIMA.

CURANTIBUS

Jos. Augusto Schultes, M. D. ET PROF.

ET

Jul. Herm. Schultes, M. ET CH. D.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN

STUTTGARDIÆ

SUMPTIBUS J. G. COTTÆ.

1829.

Linneum
OKA1
C613
1829
V.7
PT.1

16. *Sc. villosa Desf.*; foliis lanceolatis, planis, villosis, (scapum fere superantibus); floribus corymbosis; (bracteis lanceolatis, pedunculos subaequantibus.). *Desf. Fl. atl. p. 299. t. 85. f. 2. Poir. Enc. VI. p. 743.*

Habitus *Sc. lingulatae*; sed folia angustiora, praeter characteres datos. Bulbi ovati, solidi, tunicati. Folia radicalia, integerrima, procumbentia, obtusiuscula vel subacuta, inaequalia, 4-5 poll., 2-3 lin. lata. Scapus rectus foliis parum brevior, simplex, glaber, teres. Pedunculi filiformes, inaequales, floribus longiores: inferiores pollicares, superiores breviores; bracteis lanceolatis, concavis, membranaceis, acutis, nunc longioribus nunc brevioribus pedunculo. Cor. laete caerulea, magnitudine *amoenae*, laciniis 6 patentibus, ellipticis, obtusiusculis. Stamina corollâ breviora; filamentis planis, basi dilatatis. Stylus longitudine staminum, stigmate simplici. Germen subrotundum. *Poir. Sc. odoratae proxima. Link et Hoffmanns. In arenis prope Kerwan, hyemalis. 4.*

17. *Sc. latifolia Willd.*; foliis lanceolatis, v. ovato-oblongis, acutis; racemo multifloro; bracteis setaceis. *Reliqu. Willd. Ms.*

Bulbus magnitudine ovi gallinacei. Folia pedalia et ultra, 3-4 poll. lata, acuta, tenuia, laevissima. Scapus foliis brevior, apice racemosus. Pedicelli vix $\frac{1}{2}$ poll., flores parvi, e minimis generis. *De Schlechtend fl.. In Teneriffa. Broussonet. 4.*

18. *Sc. undulata Desf.*; foliis (hysteranthiis), lanceolatis, undulatis; floribus laxe racemosis; bracteis (subulatis) brevibus. *Desf. Atl. 1. p. 300. t. 87. Poir. Enc. VI. p. 742. Horn. H. Havn. 1. p. 331. Vivian. Fl. lyb. p. 20. Moris Stirp. Sard. Elench. Fasc. 1. p. 47.*

Bulbi ovati, compacti; tunicae membranaceae, solutae. Folia post anthesin, decumbentia, utrinque glabra, 3-4 poll., $\frac{1}{2}$ poll. lata, acutiuscula. Scapi graciles, teretes, recti, 1-2 ped.. Pedunculi filiformes, floribus longiores, basi bracteis subulatis, minutissimis. Cor. campanulata, pallide rosea, patens; laciniis profundis, linearibus, obtusiusculis, medio intensius tinctis. Filamenta angusta, aequalia. Antherae flavae. Stylus longitudine staminum. Caps. obtusa, triangularis, scapo appressa, polysperma. Sem. nigra angulosa. *Desf. et Poir.. In specimenibus e Sardinia omnia fere eadem; bulbus albidus, $1\frac{1}{2}$ poll., fibris radicalibus crassis. Scapus 9 poll., crassitie pennae gallinaceae, glaber, inferne purpurascens, superne rore glaucescente. Racemus 5 poll., erectus, multiflorus. Pedunculi erecto-patentes, 2-3 lin.. Bractee membranaceae, angustissimae, 1- $1\frac{1}{2}$ lin.. Cor. lacinae 4-5 lin., $\frac{3}{4}$ lin. latae, basi angustatae. Stamina corollâ paululum breviora; filamenta basi laciniarum inserta, inferne paulo dilatata et albida, superne subulata, rosea; antherae oblongae, vix lin.. Stylus in defloratis stamina superans. Stigma incrassatum. *In Barbariae collibus circa Tunis et Algier, autumnalis, Desf.; in Sardinia, Moris, Müller; in Corsica Loisel. 4.**

19. *Sc. obtusifolia Desf.*; scapo laterali; foliis (hysteranthiis), linguiformibus, undulatis; floribus racemosis, ebra

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Page [!]]

To cw CMT UK
: into rryAE boa
EQUITIS, | P1
SYSTEMA VEGETABILUM «-
SECUNDUM ; z
CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES;
| ; | CUM :
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS
ET
SYNONYMIIS.
EDITIO NOVA, SPECIEBUS INDE AB EDITIONE XV. DETECTIS
AUCTA zr LOCUPLETATA.
VOLUMINIS SEPTIMI PARS PRIMA.
CUBRANTIBUS
oos, HcUGUSsTO SeuHurLTESs, M. D. xr Paor.
ET
|
Jur. HzRM. ScuvurmTESs, M. xr Cz. D.
— Å—9Å
| SvrrGAnDTIAR
SUVAuTiBUS » Mw Corta
Baa

[Begin Page: Page 566]

56655 HEXANDRIA. MONOGYNIA. Seir:
o6. ^ Sc. villosa Desf.; foliis lanceolatis, planis, villosis,
(scapuii fere superantibus); floribus corymbosis; (bracteis lan-
ceolatis, pedunculos subaequantibus.). esf. Fl. atl. p. 299.
l. 85. f. 2. Poir. Enc. VI. P. 748: " i "5 "
Habitus Sc. Jngulatac; sed folia angustiora, praeter charaeteres da-
tos. Bulbi ovati, solidi, tunicati. ^ Folia radicalia, integerrima,
procumbentia ,... obtusiuscula vel subacuta, inaequalia , 4-5 poll.,
2.5]lin.lata. — Scapus rectus foliis parum brevior, simplex, gla-
ber, teres. Pedunculi filiformes, inaequales, floribus longiores:
inferiores pollicares, superiores breviores; bracteis lanceolatis,
concavis, membranaceis, acutis, nimc longioribus nunc breviori-
bus peduneulo. .. Cor. laete caerulea, magnitudine amoenae, laci-
miis. 6 patentibus, ellipticis, obtusiusculis; ^ Stamina corollà bre-
»viora; filamentis planis, basi dilatatis. | Stylus lon itudine stami-
num, stigmatè simplici... Germen subrotundum. | Poir. \$c.
ratae proxima. Link et Hoffmanns. «|n arenis prope Fier-
wan, hyemalis. | 21. ;
175 Sc. latifolia JV illd.; foliis lanceolatis, v. ovato-
oblongis, acutis; racemo multifloro; bracteis setaceis. fteligu.
JFilld. Ms.
Bulbus magnitudine. ovi gallinacei. Folia pedalia et ultra; 3-1 poll.

lata, acuta, tenuia, laevissima. — Scapus foliis brevior, apice racemosus, Pedicelli vix $\frac{1}{2}$, poll., flores parvi, e minimis generis.

De Schlechtend fil. In Teneriffa. Broussonet.

18. Sc. undulata Desf. : foliis (hysteranthiis), Janceola--ts, undulatis; floribus laxe racemosis; bracteis (subulatis) brevibus. Desf. Atl. 1. p. 500. t. 87. Poir. Enc. VI. p. 74?

Horn. H. Havn. 1. p.531... F'ivian. Fl.lyb. p. 20... Moris

Stirp. Sard. Elench. Fasc. I- p. 47. (

Bulbi ovati, compacti; tunicæ membranaceæ, solutæ. Folia pos!

anthesin, decumbentia, utrinque glabra, 5-4 poll. $\frac{1}{2}$, poll. lata 'æutiuseula. Seapi graciles, teretes, recti, 1-2 ped.. Pedunculi

filiformes, floribuslongiores, basi bracteis subulatis, minutissimis. ' Cor. eampanulata ; pallide rosca, patens; laciniis profun--dis, linearibus, obtusiusculis, medio intensius tinctis. Filamenta

"angusta, aequalia. Anthæraeflavæ. Styluslongitudine staminu-Caps. obtusa, triangularis, Scapo appressa , polysperma. Sen

nigra angulosa. Jjesf. et Poir. In sicehiiruib e Sardinia omnia fere eâdem; bulbus albidus, $\frac{1}{2}$, poll, fibris radicalibus

crassis. Scapus 9 poll, crassitie pennæ gallinacæ, glaber: i fere purpurascens, superne rore glaucescente. Hacemus 5p x

erectus, multiflorus, " Pedunculi erecto-patentes, 2.5]in. br? teæ membranacæ , angustissimæ, 4-1 $\frac{1}{2}$, lin. Cor. lacis

4-5 lin., $\frac{3}{4}$, lin. latæ, basi angustatæ, — Stamina corollâ pau b lum breviora; filamenta basi laeiniarum inserta, inferne p? :

dilatata et albida, superne subulata, rosea; antheræ oblongæ vixlin. Stylus in'defloratis stamina superans. Stigma incre-

tum. — — jn Barbariæ collibus circa Tunis et AUGIT tumnalis, Desf.; in Sardinia, Moris, Müller; "M

sica Loisel. LE M ALum LU BILL It sala 2:1 3499 P .19. Sc. obtusifolia DDesf.; scopo laterali; foliis (197

ranthiis) , linguiformibus, undulatis ; floribus racenosis , z