

## 68 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

*lycibus hirsutis, pedunculis bracteis brevioribus.*  
*W. E.*

*Hab. in maritim. Africæ boreal. 24. T. intr. 1815.*

33. (post. 31). *L. REFLEXA*: foliis oblongis glabris, mis ternis, superioribus alternis, pedunculis laribus, caule adscendente. *Vahl. Symb. sub tirrh.*

*Hab. in Barbaria* ♂. D. intr. 1815.

### 733. ANTIRRHINUM.

1. *A. MAJUS* ♀. elegans.

*Hab. — — ♂. D. intr. 1815.*

### 735. MARTYNIA.

2. *M. DIANDRA*: caule ramoso, foliis oppositis condentatis, floribus diandris. *W. Sp.*

*Hab. in Mexico.* ♂. C. intr. 1817.

### 737. SCROPHULARIA.

25. (5-6). *S. SMITHII mihi*: foliis ovato-cordatis distato crenatis subtus tomentosis, panicula pyramidalis racemosa, racemis dichotomis, floribus cundis.

*Hab. in Canariis.* ♂. T. intr. 1816. *Communica celeb.* *C. Smithio.*

27. (9-10). *S. HIRSUTA* Kit.: tota lanato-hirsuta, foliis duplicato-grosse-arguteque dentatis, pedunculis trichotomis.

*Hab. — — ♀. D. intr. 1817.*

26. (11-12). *S. RUGOSA* W. Suppl.: foliis ovato-cordatis apice attenuatis rugosis grosse dentatis, pedunculis trichotomis.

*Hab. — — ♀. D. intr. 1817.*

23. *S. VERNALIS* β. *cordata*: foliis subrotundo-cordatis apice rotundatis rugosis grosse dentatis, pedunculis trichotomis.

*Hab. in Hungaria* 24. D. intr. 1815. — *S. cordata* Pe

23. (15-16). *S. VERBENAEFOLIA* Vahl.: foliis oblongis pinnatifidis dentatis basi cuneatis, ramis paniculatis flexuosis.