



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Flore de France; ou, Description des plantes qui croissent naturellement en France et en Corse

Paris, J. B. Baillire; [etc., etc.], 1848-56

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/6635>

1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/29589>

Page(s): Title Page, Page 221

Holding Institution: New York Botanical Garden, LuEsther T. Mertz Library

Sponsored by: The LuEsther T Mertz Library, the New York Botanical Garden

Generated 31 January 2025 11:54 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1771061i00029589.pdf>

This page intentionally left blank.

FLORE
DE FRANCE,

OU

DESCRIPTION

DES PLANTES QUI CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE ET EN CORSE,

PAR

M. GRENIER,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET ÈS SCIENCES, PROFESSEUR À LA FACULTÉ DES SCIENCES
ET À L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE BESANÇON;

ET

M. GODRON,

DOCTEUR EN MÉDECINE ET ÈS SCIENCES, PROFESSEUR À L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE NANCY.

TOME PREMIER.

A PARIS.

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

Libraire de l'Académie royale de Médecine, 17, rue de l'École-de-Médecine;

A LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

A BESANÇON,

CHEZ DE SAINTE-AGATHE AÎNÉ, IMPRIMEUR-ÉDITEUR;

1848.

1847 - voir p. 762 sur cette

*** Calice contracté au sommet à la maturité.

S. CÆLI-ROSA Nob.; *Agrostemma Cæli-rosa* L. sp. 624; *Lychnis Cæli-rosa* Desr. in Lam. dict. 5, p. 644; DC. fl. fr. 4, p. 764; Dub. bot. 79; Lois. gall. 1, p. 528; Rchb. ic. 5125; Soleir. exs. 887! — Fleurs dressées, portées sur des pédoncules allongés anguleux au sommet, formant une grappe lâche; bractées herbacées. Calice allongé, renflé en massue à la maturité, non ombiliqué, à nervures principales saillantes, quelquefois rudes (*Lychnis aspera* Poir. supp. 5, p. 557); un sillon plissé transversalement placé de chaque côté des bandes transparentes; dents longues, acuminées-subulées. Pétales à limbe en cœur renversé, munis à la gorge d'une longue écaille linéaire bifide; onglet non auriculé. Anthères linéaires. Capsule ovoïde-conique, égalant le thécaphore glabre. Graines petites, réniformes, planes sur les faces et sur le dos, tuberculeuses. Feuilles linéaires longuement acuminées, très-aiguës, souvent rudes sur les bords. Tige dressée. Racine grêle, pivotante. — Plante de 2-3 décimètres, verte, glabre; fleurs assez grandes, roses en-dessus, pâles en-dessous.

Hab. Les Sablettes près de Toulon (Robert); Hyères; Corse, Saint-Florent. (I) Avril-mai.

VISCARIA. (Rohl. deutsch. fl. 2, p. 57.)

Calice à 5 dents, à tube muni de nervures commissurales. Pétales à limbe plane, pourvus d'une coronule; onglet cunéiforme sans bandelettes ailées. Dix étamines. Cinq styles glabres insérés sur le prolongement des commissures du fruit. Capsule avec cloisons; déhiscence *loculicide*; valves en nombre égal à celui des styles, opposées aux feuilles calicinales. Graines réniformes, tuberculeuses, portant l'ombilic sur le côté.

V. PURPUREA Wimm. fl. von Schlesien p. 67; Fries Lindb. botan. notiser 1842, n° 10; Braun fl. od. bot. zeit. 1843, p. 375; *Lychnis Viscaria* L. sp. 625; DC. fl. fr. 4, p. 761; Dub. bot. 78; Lois. gall. 1, p. 526; Rchb. ic. 5131. — Fleurs brièvement pédonculées, en grappe trichotome, oblongue, assez serrée, interrompue. Calice obconique, à la fin en massue, ombiliqué, souvent pubescent, à dents courtes, triangulaires aiguës. Pétales à limbe obové, un peu émarginé, onduleux sur les bords, munis à la gorge de 2 longues écailles tronquées; onglet auriculé au sommet. Anthères oblongues. Capsule ovoïde, égalant le thécaphore glabre. Graines très-petites, brunes, réniformes, planes sur les faces, canaliculées sur le dos, finement tuberculeuses. Feuilles un peu fermes; les inférieures oblongues, atténuées en pétiole; les supérieures linéaires. Souche à divisions courtes, émettant des rosettes de feuilles et des tiges fleuries dressées, fistuleuses, simples, à mérithalles très-allongés. — Plante de 5-6 décimètres, d'un vert foncé, purpurine au sommet, glabre, visqueuse; fleurs lilas.

Hab. Est et centre de la France, prés secs et bois montagneux. 7 Mai-juin.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

FLORE

DE FRANCE,

ou

DESCRIPTION

ES PLANTES QUI CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE ET EN CORSE,

M. GRENIER,

docteur en médecine et es sciences, professeur à la faculté des sciences

et à l'école de médecine de Besançon;

M. GODRON

DOCTEUR EN MÉDECINE ET ES SCIENCES, PROFESSEUR À L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE NANCY.

TOME PREMIER.

À PARIS.

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

Libraire de l'Académie royale de Médecine, 17, rue de l'École - de - Médecine ;

A LONDRES, CHEZ II. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

A BESANÇON,

CHEZ DE SAINTE- AGATHE AINE , IMPRIMEUR-ÉDITEUR!

1848.

[Begin Page: Page 221]

SILÉNÉES. 221

Cul'irc contrarié au sommet à lu maturité.

S. C Ku-noNi Nob.; Agrostemma Cceli-rosa t.. sp. <i2i ;

Lychnis CcnH-rosa Desr. in Lam. dict. 3, p. 644; Z) C. /?. fr. 4,

p. 764; Pm6. /»>/. 7'.); Lois. gallI, p. 328; liclib. ic.IVWâ;

Soleir. eoes. 887 ! — Fleurs dressées, portées sur des pédoncules

allongés anguleux au sommet, Formant une grappe lâche; bractées

herbacées. Calice allongé, renflé en massue à la maturité, non om-

biliqué, à nervures principales saillantes, quelquefois rudes [Lychnis

aspera Poir. supp, 5, p. 537) ; un sillon plissé transversalement

placé de chaque côté des bandes transparentes ; dents longues, acu-

ininées-subulées. Pétales à limbe en cœur renversé, munis à la

gorge d'une longue écaille linéaire bifide ; onglet non auriculé. An-

thères linéaires. Capsule ovoïde-conique, égalant le thécaphore

glabre, daines petites, réniformes, planes sur les faces et sur le

• lus, tuberculeuses. Feuilles linéaires longuement acuminées, très-

aiguës , souvent rudes sur les bords. Tige dressée. Racine grêle,

pivotante. — Plante de 2-5 décimètres, verte, glabre ; fleurs assez grandes, roses en-dessus, pâles en-dessous.

Ilab. Les Snhlettes près de Toulon (Robert); Hyères; Corse, Saint-Florent.

I Avril-mai.

"VTSCAKIA. (Rohl. deutseh. 11. 2, p. 57.)

Calice à 8 dents, à tube muni de nervures commissurales. Pétales à limbe plane, pourvus d'une coronule ; onglet cunéiforme sans bandelettes ailées. Dix étamines. Cinq styles glabres insérés sur le prolongement des commissures du fruit. Capsule avec cloisons; déhiscence loculicide; valves en nombre égal à celui des styles, opposées aux feuilles calicinales. Graines réniformes, tuberculeuses, portant l'ombilic sur le côté.

W. purpitrea Wimm. fl. von Schlesien p. 67; Frics Lindb.

botan. notiser 1842, n° 10; Broun fl. od. bot. zeit. 1843, p. 375;

Lychnis Viscaria L. sp. 625; DC. fl. fr. 4, p. 761; Dub. bot. 78;

Lôw. gall. 1, p. 326; Rchb. ic. 5131. — Fleurs brièvement pédonculées, en grappe trichotome, oblongue, assez serrée, interrompue. Calice obovique, à la fin en massue, ombiliqué, souvent pubescent, à dents courtes, triangulaires aiguës. Pétales à limbe obové, un peu émarginé, onduleux sur les bords, munis à la gorge de 2 longues écailles tronquées ; onglet auriculé au sommet. Anthères oblongues. Capsule ovoïde, égalant le thécaphore glabre. Graines très-petites, brunes, réniformes, planes sur les faces, canaliculées sur le dos, finement tuberculeuses. Feuilles un peu fermes ; les inférieures oblongues, atténuées en pétiole; les supérieures linéaires. Souche à

divisions courtes, émettant des rosettes de feuilles et des tiges fleuries dressées, fistuleuses, simples, à mérithalles très-allongés. — Plante de 3-6 décimètres, d'un vert foncé, purpurine au sommet, glabre, visqueuse; fleurs lilas.

llab. Est cl centre de la France, prés secs et bois montagneux, "if- Mai-juin.