



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

Caroli Linnaei ... Species plantarum :exhibentes plantas rite cognitatas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas...

Holmiae, Impensis Laurentii Salvii, 1753

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/669>

vol. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/13829>

Page(s): Title Page, Page 420

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 2 February 2025 9:34 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1771476i00013829.pdf>

This page intentionally left blank.

CAROLI LINNÆI

S:Æ R:GIÆ M:TIS SVECIÆ ARCHIATRI; MEDIC. & BOTAN.
PROFESS. UPSAL; EQUITIS AUR. DE STELLA POLARI;
nec non ACAD. IMPER. MONSPEL. BEROL. TOLOS.
UPSAL. STOCKH. SOC. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES

PLANTAS RITE COGNITAS,

AD

GENERA RELATAS,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIFICIS,
NOMINIBUS TRIVIALIBUS,
SYNONYMIS SELECTIS,
LOCIS NATALIBUS,

SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.

TOMUS I.

Cum Privilegio S. R. M:tis Sueciæ & S. R. M:tis Polonicae ac Electoris Saxon.

HOLMIÆ,

IMPENSIS LAURENTII SALVII.

1753.

Viscago lævis, inaperto flore. *Dill. elth.* 424. t. 315.
f. 407.

Habitat in Europa australi. ☉

ereica.

20. **SILENE** erecta lævis, calycibus erectis fulcatis, petalis emarginatis. *Hort. ups.* 112. *

Viscago foliis inferioribus bellidis, superioribus tunicæ, calyce strictiore & turgidior. *Dill. elth.* 422 t. 314.
f. 404. 405.

Habitat in Creta.

portensis.

21. **SILENE** caule dichotomo paniculato, calycibus striatis, petalis bifidis, foliis linearibus.

Silene caule erecto, pedunculis longissimis erectis unifloris, foliis lineari-lanceolatis, *Roy. lugdb.* 447.?

Habitat in Lusitania. *Læfl.* ☉

Habitus S. inapertæ, at Folia angustiora, & Calyces longitudinaliter striati. Planta spithamea, brachiata, dichotoma. Folia linearia acuta glabra. Pedunculi filiformes, angustissimi, longi, erecti, e dichotomia caulis, uniflori. Calyces clavati, longi, purpurascens, striis alternis albis. Stamina longitudine fere corollæ.

Muscipula.

22. **SILENE** petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris.

Silene floribus tristylis, foliis lanceolatis sessilibus, capsulis trilocularibus, floribus ternis. *Sauv. monsp.* 145.

Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. Baub. pin. 205.

Lychnis sylvestris 3. Clus. hist. 1. p. 289.

Habitat in Hispania, G. Narbonensi.

polyphylla.

23. **SILENE** foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. *Roy, lugdb.* 447.

Lychnis sylvestris, plurimis foliolis simul junctis. Baub. pin. 205.

Lychnis sylvestris VIII. Clus. hist. 1. p. 290.

Habitat in Pannonia, Austria, Bohemia. ♀

LYCHNIS.

Armeria.

24. **SILENE** floribus fasciculatis fastigiatis, foliis superioribus cordatis glabris. *Hort ups.* 110.

Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus terminalibus fasciculatis fastigiatis. *Hort. cliff.* 172. *Roy, lugdb.* 446. *Sauv. monsp.* 153.

Lych-

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Title Page]

CAROLI LINNZEI

S: R: crg. M: ris Sveciæ Ancuia TRI; Mzopic.: & BorAx,
Paorrs. UPsAr; EQUITIS AUR. DE STELLA Porani;
nec non AcaD. IMPER. MowsprEr. BERor. Toros.
U»rsar. STOCKH.: Soc. & PARIS. CORESP.

SPECIES
PLANTARUM,

EXHIBENTES
PLANTAS RITE COGNITAS,

AD
GENERA RELATAS,
CUM
DirrFRENTIIS SPrcIFICIS,
NowiNIBUS TRIVIALIBUS,

SYNONYMIS SELECTIS,

Locis NaraLIBUs,
SECUNDUM

„SYSTEMA SEXUALE

DIGESTAS.
Towus I

Cum Privilégio S. R. Mtis Suecie 3? S. R. Mtis. Polonice ac Eletloris. Saxon,
«TON SN MT S NANASI — DIT ININ m ^

HOLMIÆ,
IureNSiS LAURENTII SALVII.

[Begin Page: Page 420]

420 DECANDRIA TRIGYNIA.

Vifcago levis, inaperto flore. Dll. elth. 424. t. 315. i

f. 407.

Habitat in Europa auftrali. ©

eei — 20. SILENE erecta lævis, calycibus erectis fuleatis, pe-`

talis emarginatis. Hort. spf. 112. ¥ — — J
Vifcago foliis inferioribus bellidis, fuperioribus tunics,
^ .calycefrictiore & turgidior. D:A. elzb. 422 7.514

: 404. 40\$
Habitat 132 teta.

pete. 231, SILENE caule dichotomo paniculato, calycibus ftri-
atis, petalis bifidis, foliis linearibns.

Silene caule ere&o, pedunculis longiffimis ere&is uni

floris, foliis lineari-lanceolatis, Roy. lugdb.. 447-?
Habitat in Lufitània. Læfl. -© .
Habitus S. inapert, at Folia anguftiora, 9 C alyces lon-
gitudinaliter jiriati, Planta Jpithameæa, brachiata, di-
chotoma. Folia linearia acuta glabra. Pedunculi fili-

. formes;angufiifimi, longi,erecti, e dichotamia caulis,
uniflori. Calyces clavati, longi, purpurafcentes, firiis
«alternis albis. Stámina longitudine fere corollæ.

Mufcipula, 33, SILENE petalis bifidis; caule dichotomo, floribus
axillaribus feffilibus,foliis glabris. `^
Silene floribus triftylis, foliis lanceolatis feffilibus, Cà^
pfalis trilocularibus, floribus ternis. Sv. mos: 145-
Lychnis fylveftris vifcoía rubra altera. Bauh. pin. 205.
Lychnis fylveittis 3. Claf. hift. 1. p. 289.
Habitat sa Hifpania, G. Narbonenfi.

polyphylla, 33, SILENE foliis fafciculatis fetaceis: ramorum flo-
rentium oppofitis. Roy, /ugdb. 447.

Lychnis fylveftris, plurimis foliolis fimul jun&is. Bauh. |

“pin. 2og.
Lychnis fylveftris VIII. Claf. 5iff..1. p. ago.
Habitat in Pannonia, Auftria, Bohemia. Z

LYCHNIS.

Armes. 24, SILENE foribus fafciculatis faftigiatis, foliis fupe- i
rioribus cordatis glabris. Herz zpf. 110. i
' Silene foliis lanceolato-ovatis glabris, floribus termina-
libus fafciculatis faftigiatis: Hort. chf. 171. A9
jugdé. 446. Janv. mow[p. 153. —

dhii

MUT

Lych-`