

cordatis petiolatis rugosis, 3 nerviis. Petiolis connato vaginantibus, margine ciliatis, sulcatis. Foliolis calycinis exterioribus minutis, saepius deciduis in fructu. Capsulis hirtis. Petalis crenatis, roseis, minoribus, quam in C. vagin.

Dr. Smith Noten.

1. *HELIANTHEMUM canariense* Jacq.

2. *guttatum*. P. E.

Dunal hat noch beschrieben von den kanarischen Inseln nach Broussonetischen Exemplaren *Helianthemum confertum* und *mucronatum*. *Dec. Prodrom.* Ch.

3. *HELIANTHEMUM plantagineum* P.

VIOLACEAE.

5. *VIOLA cheiranthifolia*.

3. *canina*. nE. P.

3. *odorata*. nE.

2.* *tricolor*. E. P.

RUTACEAE.

450 1. *ZYGOPHYLLUM album*, E.

2. **FAGONIA cretica*, E.

F. cret. Die Pflanze wird viel zum Waschen und „vivificare“ schwarzer Zeuge gebraucht.

1. *RUTA pinnata*.

CARYOPHYLLEAE.

2. **MINUARTIA montana*. E.

2. **SPERGULA arvensis*. P. E.

2. *ARENARIA maritima*. P. E.

2. *DIANTHUS prolifer*. P. E.

2. **SILENE gallica*, P. E.

3. *lagunensis* Sm. (*statiuefolia*).

S. lagun., ist nicht *S. canar.* Sp. und *Dec. Prod.*, sondern steht vielmehr *S. imbricata* Desf. nahe. Lk.

3. *SILENE nutans*, nE.

450 2. * *inflata*.

Durch Cour.

2. * *behen*. P.

Durch Cour.

2. **CERASTIUM vulgatum*. P. E.

Durch Cour.

1. *FRANKENIA laevis*. P. E.

1. *ericifolia* Sm.

Cf. Decand. Prodrom. I, 350.

1. *pulverulenta*.

1. **LINUM decumbens*. E. P.

2. **SAGINA procumbens*.

5. *ALSINE media*. nE. P.

SEMPERVIVAE.

3. *SEMPERVIVUM barbatum* Sm.

spathulatum Horn.

lineolare Haw.

Semp. barb., ausgezeichnet durch das auf den Blättern, ihrer Länge nach, in der Jugend ausschätzende Gummi. Es bleiben Narben zurück, welche auf ältern Blättern parallele Linien bilden. Die Blätter bilden eine Rose am Fuße des Stiels.

450 4. *SEMPERVIV. caespitosum* Sm.

barbatum Hornem.

ciliatum Bot. Mag.

t. 1987.

3. *aureum* Sm. *calyciforme* Haw.

3. *foliosum* Sm. *Smithii* Bot. Mag. t. 1980.

2. *urbicum* Sm.

Conf. Hornemann Hort. Hafn. Suppl.

2. *annuum* Sm.