



<https://www.biodiversitylibrary.org/>

**Systema naturae per regna tria naturae : secundum
classes, ordines, genera, species, cum characteribus,
differentiis, synonymis, locis**

Lipsiae [Leipzig], Impensis Georg. Emanuel. Beer, 1788-1793

<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/545>

v. 2, pt. 1: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/10292>

Page(s): Text, Title Page, Text, Page 503

Holding Institution: Missouri Botanical Garden, Peter H. Raven Library

Sponsored by: Missouri Botanical Garden

Generated 1 June 2024 5:42 AM

<https://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/1704394i00010292.pdf>

This page intentionally left blank.

LINNÉ
CAROLI A LINNÉ,

Equitis aurati de stella polari,

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. UPSAL. ACAD. PARIS.

UPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROLIN. IMPER. LONDIN. ANGL.

MONSP. TOLOS. FLORENT. EDINB. BERN. SOC.

SYSTEMA
NATURAE

PER

REGNA TRIA NATURAE,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS.

TOMUS II.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA, REFORMATA.

CURA

JO. FRID. GMELIN,

PHYS. ET MED. DOCTOR. HUJUS ET CHEM. IN GEORGIA AUGUSTA PROF.
P. O. ACAD. CAESAR. NATURAE CURIOSORUM ET ELECTORAL. MOGUNTIN,
ERFORDENSIS, NEC NON SOCIET. REG. SCIENT. GOETTINGENSIS,
PHYSICAE TIGURIN., ET METALLICAE MEMBRI.

LIPSIAE, 1791.

IMPENSIS GEORG. EMANUEL. BEER.

CAROLI A LINNÉ
S Y S T E M A
NATURÆ.

TOM. II. PARS I.

**** foliis multifidis.

- caerulea. 32. P. foliis palmatis integerrimis. Knorr del. hort. I. t. P.
 ferrata. 33. P. foliis palmatis serratis. Amoen. acad. I. p. 231. f. 21.
 pedata. 34. P. foliis pedatis serratis. Amoen. acad. I. p. 233. f. 22.

SUAEDA. *Cal. carnosus 5fidus. Cor. o. Sem. I.*

baccata. 1. S. foliis teretibus nitidis punctatis, fructu baccato. Forsk.
 fl. aeg. arab. p. 69.

hortensis. 2. S. foliis linearibus farinosis, calicibus fructus divergentibus.
 Forsk. fl. aeg. arab. p. 71.

vera. 3. S. foliis seimiteretibus farinosis non punctatis, stigmatibus
 peltatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 69.

anony- 4. S. foliis oblongis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 69. an vere di-
 ma. stincta?

vermicu- 5. S. foliis carnosis ovato-subglobosis farinosis punctatis, stig-
 lata. matibus subulatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.

fruticosa. 6. S. caule fruticoso, foliis sparsis carnosis linearibus utrinque
 convexis, stigmatibus subulatis. Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.

monoica. 7. S. caule fruticoso diffuso, floribus masculis germine supra
 orbiculato. Forsk. fl. aeg. arab. p. 70.

376. TURNERA. *Cal. 5fidus, infundibuliformis :
 exterior 2phyllus. Petala
 5calici inserta. Stigmata mul-
 tifida. Caps. ilocularis, 3-
 valvis, supera, polysperma.*

ulmifo- 1. T. floribus sessilibus petiolaribus, foliis basi biglandulosis.
 lia. Mill. illustr. ic. Gaertn. de fr. et sem. cent. 5. t. 76. f. 3.
 β) Mill. ic. t. 268. f. 2.

Pumilea. 2. T. floribus sessilibus petiolaribus, foliis eglandulosis. Sloan.
 hist. jam. I. t. 127. f. 6.

Sidoides. 3. T. pedunculis axillaribus bisetis, foliis obovato-cuneatis ser-
 ratis. Mant. p. 58.

rupestris. 4. T. pedunculis axillaribus bistipulatis, foliis linearibus serratis.
 Aubl. pl. guj. I. p. 289. t. 113. f. 1.

The following text is generated from uncorrected OCR or manual transcriptions.

[Begin Page: Text, Title Page]

^ Eguiris aurati » vA polari,
ARCHIATRI REGH, MED, ET. BOTAN, PROFES. UPSAL, ACAD. PARIS, Co 2
UFPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROLIN, "IMPER. ,LONDIN. ANGL. :
| MONSP, TOLOS, FLORENT. EDINB, BERN. SOC.
SYSTEMA.
(^0 NATURAE--:
E
»
"x T2 [LÀ
IN 19115123135
PER
.REG "m [RÍA: NATURAE, |
^ | "iveUWbvir- E :
" x CLASSES, ORDINES, — -
E GENERA, SPECIES,
CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS.
PS
TOMUS II.
EDITIO DECIMA TERTIA, AUCTA WENT
H
: - CURA
DEC JO. FRID. GME ELIN,
armos. ET MED, DOCTOR, HUJUS ET CHEM, iN Gkc GEORGIA AUGUSTA PROF,
P,Q, ACAD, CAESAR. NATURAE CURIOSORUM ET ELECTORAL, MOGUNTIN,
ERFORDENSIS, NEC NON SOCIET, REG, SCIENT. GOETTINGENSIS,'
PHYSICAE TÍGURIN,, ET METALLICAR MEMBRI,
LI
LIPSIAE, 1791,
AMPENSIS GEORG RMANUEL BEER.

[Begin Page: Text]

ds CAROLLI ALINNE —
SYSTEMA
NATURAE.
TOM. III PARSL

[Begin Page: Page 503]

My tae j
de exerole, 32. P. folis dean eom Kir p ort IA P,
— ferrata. E foliis palmatis ferratis. - Amen. acad. E p. 23x. f. 2X.
pedata, A 34 P. foliis . pedatis ferratis. amen. ac «ead. MPO Jd M
SUAEDA. Cal. carnofüs sfidus. Cor. o. Sem, x. Man.
baccata. 4. S. foliis teretibus nitidis pun&atis, fudu baccato, Foi. 2
ft. aeg. arab. p. 69. | -
hores 2. S. foliis linearibus farinofis,, calicibus fru&as divergentibus,

: Forsk. ff. as arab. p. 7H- IRE
- Vera. 3. S. J5Uad "U ter farinofis. mon punctis, füjatib
cu. ss peliatiss Forsk. ft atg arab. p.69. | à
L [|] E d T 3 ara kp: óg. a vere di
verd I - \$. foi ovato - fübglobofis Loud uy, 4
Ha. Ee cet e aeg.arab. p. 70. — We
fruticolo , foliis fparfis. carhiofis linearibus utrinque -
E pos S. caule
convexis , ftigmatibus fubulatis, — Forsk. ff.aeg. arab. p. 70.
monoica. 7\$ caule fruticofa diffufo , floribus maftculis germine fupra .'
dcus orbiculato. . Forsk. ft. aeg. arab. bdo :eprug *.
n sidus y. infgndibullioramis - :
. exterior »phyllus.- MM E
HOT POICHEHDIN S 2 d upper t aul-
E ir pese dee -Capf- Mock" 3
t. dens "ees füpera, polyfperma.
vlnifo-.. n T. floribus feffilibus petiolaribus, "folis ToS.
ABL Mil. dllufir. ic, Gaertn. de fr. er fem. cent. y t. 76. f. 3.
m Mil. ic. 1.268. fea. S
s floribus, fcffilibus petiolaribus , foli UE Sloan.
na . jam. ». - 127. f. t 6.
lunculis axillaribus bifetis, fois oborato-cun
i-i jut