

BULLETIN
DE LA
Société d'Histoire Naturelle
de l'Afrique du Nord

Fondée le 27 Mai 1909

TOME DIX-NEUVIÈME

ANNÉE 1928



Siège de la Société

FACULTÉ DES SCIENCES D'ALGER

25

ALGER
IMPRIMERIE « LA TYPO-LITHO »
—
1928

Hab. ad margines agrorum prope Castiglione (Bou-Ismaël) Mauretaniae, julio et agosto florens (CLAUSON, Herb. Fontanesianum normale, n° 5 ; DURANDO ; in Herb. Univers. Alger).

var. *aurasiaca* Maire, n. var. — A typo (var. *genuina* Maire) differt pedicellis laevibus l. six scabridulis ; petalis saepius apice emarginatis l. erosis, stylis staminibus brevioribus. Capsula ut in typo monosperma ; semina c. 1,5 mm longa.

Hab. in rupestribus calcareis montium Aurasiorum Numidiae, a junio usque ad augustum florens ; in monte Mahmel, ad alt. 2100m; prope Sgag in calvitiis cedretorum, 1600-1700 m. (MAIRE 1920, in Herb. Univers. Algeriensis).

Cette petite race est plus voisine du type que la précédente. Des spécimens récoltés sur le Djebel Dréat par LETOURNEUX ont des pédicelles plus scabres et font transition avec le type.

367. **Zygophyllum gaetulum** Emb. et Maire, n. sp. — A *Z. albo* L., cui valde affine et habitu persimile, differt fructu obovato-oblongo 10-11 mm longo, in parte inferiore (c. 6 mm longa) pentagono-tubuloso, in parte superiore sensim parum dilatato), parte libera carpellorum brevissima (1-2 mm) ovata obtusa erecto-patula (nec obovato-furbinato c. 6 mm longo, usque ad basim attenuato, parte libera carpellorum valde divaricata c. 3 mm longa).

Hab. in pascuis salsis Imperii marocanni austro-orientalis : in ditione Taflalet prope Erfoud. Aprili floret. — Typus in Herb. Univers. Algeriensis et in Herb. Inst. Scient. Rabatensis.

368. **Nitraria Schoberi** L. — *N. senegalensis* Lamk. — BATTANDIER (Contr. Fl. Atlant., 1919, p. 23) signale cette plante dans le Sud-Oranais à Beni-Ounif de la façon suivante : « Un botaniste, dont j'ai oublié le nom, m'a donné cette plante de Beni-Ounif, avec la détermination exacte. » Ce botaniste est notre excellent confrère A. FAURE, d'Oran, qui a trouvé, près de Beni-Ounif, la plante représentée par un pied unique. On pouvait douter de la spontanéité de cette plante à Beni-Ounif, où elle croissait au voisinage de lieux habités. Le *Nitraria Schoberi* L. appartient cependant incontestablement à la flore du Sahara septentrional occidental. Nous l'avons en effet retrouvé assez abondamment, en mai 1927, dans la région du Taflalet (Sahara marocain). Il croissait dans des plaines salées près d'Erfoud, où ses touffes, préservant le sol de la déflation, couronnent de petits monticules, comme le font souvent celles de son congénère *N. tridentata* plus à l'Est.

369. **Haplophyllum linifolium** (L.) Juss. pro parte, Rchb. — *Ruta linifolia* L. Sp. ed. 1, p. 384 (excl. β et γ).