

SYMBOLAE BOTANICAE,

SIVE

PLANTARUM,

TAM EARUM,

QUAS IN ITINERE, INPRIMIS ORIENTALI,

COLLEGIT

PETRUS FORSKÅL,

QUAM ALIARUM,

RECENTIUS DETECTARUM,

EXACTIORES DESCRIPTIONES,

NEC NON

OBSERVATIONES

CIRCA

QUASDAM PLANTAS DUDUM COGNITAS,

AUCTORE

MARTINO VAHL,

PROFESSORE REGIO, ACAD. IMP. NAT. CUR., SOCIETATIS AGRARIAE TAURINENSIS, PHYSICO-BOTANICAE ET GEORGOPHILORUM FLORENTINORUM, GEORGICAE TREIENSIS, SCIENTIARUM, QUAE VELITRIS EST, PHYSIOGRAPHICAE LUNDENSIS, SCIENTIARUM NORVEGICAE, STOCKHOLMIENSIS, UPSALIENSIS, HISTORIAE NATURALIS HAUNIENSIS SOC. PHYS. JENENSIS SODALI.



PARS TERTIA.

CUM TABULIS XXV AERI INCISIS.

H A U N I A E,

IMPENSIS AUCTORIS.

EXCUDEBANT NICOLAUS MÖLLER ET FILIUS,
AULAE REGIAE TYPOGRAPHI.

MDCCXCIV.

RAMI purpurascens, glabri.

FOLIA latitudine & longitudine æqualia, glabra, basi cordata: *laciniæ* lanceolata, attenuata, laterales extus dentibus lanceolatis; intermedia utrinque superne profunde ferrata.

Stipule lanceolata.

RACEMI pollicares. *Umbellule* approximata.

VITIS foliis pinnatis dentato-ferratis glabris.

Patriam ignoro, dedit Dn. SCHUMACHER.

RAMI purpurascens, glabri, teretes.

Foliola quina, intermedia subsessilia, reliqua petiolata, infima saepe lobo extrorsum aucto, ovata, acuminata, utrinque ferraturis tribus vel quatuor magnis, subtus pallide viridia, bipollicaria.

Pedunculi oppositifolii, bis bifidi. *Pedicelli* umbellati.

FLORES parvi.

pinnata
10-11.

CELOSIA.

CELOSIA foliis ovato-oblongis, racemo-laxo, pistillo trifido. LIN. S. V. p. 247.

Achyranthes decumbens; caule decumbente, paniculis terminalibus axillaribus.

FORSK. descr. pag. 47.

trigyna.

THESIUM.

THESIUM foliis linearibus subcarnosis, floribus axillaribus sessilibus quinquefidis. *humile* a-3.

Alchemilla linearia folio, floribus & vasculis in foliorum alis sessilibus. SHAW.

af. 14.

Legi in cultis Tuneti. ☉

CAULIS herbaceus, erectus, vix palmaris, a basi statim ramosus. *Rami* glabri, subramosi, angulati, altitudine caulis.

FOLIA linearia, crassa, sesquipollicaria, frequentia, acuta.

CALYCIS tubus vix ullus, nec elongatus ut in Th. alpino.

CAPSULÆ globosæ, rugosæ, magnitudine seminis coriandri.

CARISSA.

CARISSA inermis, foliis ovato-cordatis mucronatis aveniis.

Habitat in India orientali. KÖNIG. †

RAMI teretes, glabri. *Spine* nullæ, saltem in meo specimine.

FOLIA opposita, petiolata, integerrima, bipollicaria vel parum ultra, duplo vel triplo latiora quam in Carissa spinarum.

PEDUNCULI terminales, terni, multiflori. *Pedicelli* brevissimi.

CALYCIS *laciniæ* fetacæ.

COROLLA pollicaris, glabra. *Laciniæ limbi* lanceolata, attenuata.

Differt a Car. spinarum ramis inermibus, foliis aveniis triplo latioribus basi rotundatis, calycinis laciniis fetacis, floribus majoribus.

A C. eduli, ramis inermibus glabris, foliis latioribus, floribus majoribus.

inermis 4.