


MONOGRAFIA DELLE TOLPIDI

DEL BARONE

ANTONINO BIVONA BERNARDI

SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACADEMIA

FIorentina de Georgofili &c.



PALERMO

1809.

Per le Stampe di Sanfilippo.

TOLPIDE A FOGLIE D'ERBA STELLA

T A V. V.

Tolpide a foglie d'Erba Stella. Foglie inferiori pinnatifide con lacinie linearie. Squame del calice addossate. Semenze dieciaristate. N.

Crepis (coronopifolia) glaberrima, foliis pinnatifidis, foliolis linearibus, caule erecto paniculato, pedunculis filiformibus, calycibus farinosis. Desf. Act. Soc. hist. nat. Paris. p. 38. t. 9. ex du synon Bocc.

Crepis foliis pinnatifidis, lacinia linearibus, radicalibus dentatis, caulinis integerrimis, caule paniculato, calycibus tomentosis, exterioribus adpressis. Wild. sp. pl. 3. p. 1606.

Crepis (succulenta) foliis pinnatifidis dentatisve subcarinosis laevisbus, calycibus subtomentosis, pappo sessili. Ait. Kew 3. p. 128.

Chondrilla (hieracoides) foliis caulinis pinnato-multifidis, peduncularum bracteis aculeiformibus, floribus subcorymbosis, pappo sessili subplumoso. Roth. Caralect. bot. 1. p. 101.

Crepis coronopifolia ovarii prælongis Vail. Act. Paris. 1721. p. 196.

Radice fissiforme, tortuosa della grossezza del piccol dito.

Caule dritto, gracile, gabbio, alto da due fino a tre piedi. Hami filiformi, disposti in pannocchia.

Peduncoli ineguali, numerosi, ordinariamente a un solo fiore, guarniti nella parte superiore di foglioline appena visibili.

Foglie glabre, in poco numero, pinnatifide, decurrenti, lunghe due o tre pollici, due o quattro linee larghe, simiglianti a quelle della *Plantago coronopus*. Foglioline linearie un poco distanti tra di loro, intrecciate o qualche volta dentate.

Calice calicettato cilindrico. Foglioline esterne sottili, acute ed un poco aperte (addos-

Tolpis Coronopifolia, Foliis inferioribus pinnatifidis, lacinia linearibus. Calyci squamis adpressis. Seminibus decemaristatis. N.

Crepis (coronopifolia) glaberrima, foliis pinnatifidis, foliolis linearibus, caule erecto paniculato, pedunculis filiformibus, calycibus farinosis. Desf. Act. Soc. hist. nat. Paris. p. 38. t. 9. ex du synon Bocc.

Crepis foliis pinnatifidis, lacinia linearibus, radicalibus dentatis, caulinis integerrimis, caule paniculato, calycibus tomentosis, exterioribus adpressis. Wild. sp. pl. 3. p. 1606.

Crepis (succulenta) foliis pinnatifidis dentatisve subcarinosis laevisbus, calycibus subtomentosis, pappo sessili. Ait. Kew 3. p. 128.

Chondrilla (hieracoides) foliis caulinis pinnato-multifidis, peduncularum bracteis aculeiformibus, floribus subcorymbosis, pappo sessili subplumoso. Roth. Caralect. bot. 1. p. 101.

Crepis coronopifolia ovarii prælongis Vail. Act. Paris. 1721. p. 196.

Radice fissiforme, tortuosa della grossezza del piccol dito.

Caule dritto, gracile, gabbio, alto da due fino a tre piedi. Hami filiformi, disposti in pannocchia.

Peduncoli ineguali, numerosi, ut plurimum monostiori, foliolis vix visibilibus superne muniti.

Folia glabra, pauca, pinnatifida, decurrentia 2-3 pollices longa, 2-4 lineas lata, Plantaginis coronopus; Foliola linearia acutiuscula, remota, integerrima, vel quandoque dentata.

Calyx calicellatus, cylindricus, foliolis exterioribus exilis, acutis, laxiusculis, adpressis sed.