

pétioles comprimés, longs d'un pouce au plus. On y trouve quelquefois des feuilles moitié plus courtes, très-obtusés, arrondies à leur sommet, à peine dentées; les stipules membraneuses. Les fleurs, que je n'ai point vues, sont disposées en grappes, selon Plumier; mais la plante de cet auteur, dont les feuilles sont représentées dentées dans toute leur longueur, est-elle la même que celle-ci?

Cette plante a été recueillie par M. Riedlé à Porto-Ricco. (*V. f. in herb. Juss.*)

69. ORTIE des marais. *Urtica palustris*. Juss.

Urtica foliis oppositis, longè petiolatis, ovatis, acuminatis, serratis, subglabris; spicis axillaribus, cylindricis. (N.) — *Perf. Synops. Plant.* 2. p. 552.

Urtica foliis oblongis, serratis, nervosis, petiolatis. Gronov. *Virg.* 187 & 145.

Urtica aquatica, frutescens, floribus in spicas longas ex alis foliorum egressis, &c. Clayt. n^o. 508. — Gronov. *Virg.* pag. 145.

Cette plante a été confondue par Linné avec l'*Urtica cylindrica*, d'après la citation du synonyme de Gronove; elle a de très-grands rapports avec l'*Urtica fasciculata*, dont elle diffère par ses épis solitaires. Ses feuilles se distinguent de l'*Urtica cylindrica*, ainsi que ses épis plus allongés, plus grêles. Ses tiges sont dures, un peu ligneuses, droites, glabres; ses feuilles opposées, longuement pétiolées, ovales, presque lancéolées, un peu en cœur, vertes à leurs deux faces, à peine pileuses en dessous, acuminées, dentées en scie, longues de trois pouces & plus, larges de deux; les épis droits, solitaires, axillaires, grêles, cylindriques, chargés de petits paquets un peu distans de fleurs sessiles, agglomérées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (*V. f. in herb. Juss.*)

70. ORTIE à feuilles de mûrier. *Urtica morifolia*.

Urtica foliis oppositis, ovato-cordatis, acuminatis, crenatis; amentis crassis, brevibus, oppositis. (N.)

Cette espèce se rapproche des mûriers par ses feuilles, encore plus par ses fleurs en chatons. Ses tiges sont ligneuses, glabres, cylindriques, d'un cendré-pâle; ses rameaux herbacés, à peine pileux; ses feuilles pétiolées, opposées, ovales, en cœur à leur base, parsemées de quelques poils rares, acuminées, crénelées, assez semblables à celles de l'*Urtica dioica*; les pétioles longs de six à neuf lignes; les pédoncules beaucoup plus courts que les pétioles, simples, axillaires, opposés, terminés par des fleurs sessiles, réunies en un chaton court, épais, cylindrique; d'autres moins

garnis & plus lâches, que je soupçonne être composés de fleurs mâles.

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries par M. Broussonet. *h* (*V. f.*)

71. ORTIE à fleurs nombreuses. *Urtica multiflora*.

Urtica foliis oppositis, ovato-lanceolatis, argute serratis, trinerviis, glabris, subtus reticulatis; floribus densè paniculatis. (N.)

Ses tiges sont droites, glabres, épaisses, presque ligneuses, cylindriques; les feuilles opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, glabres à leurs deux faces, longues de trois pouces & plus, larges de deux, acuminées, finement dentées en scie, à trois nervures saillantes en dessous; les veines parallèles, réticulées, saillantes; les pétioles longs d'un pouce; les fleurs très-nombreuses, disposées en une panicule presque terminale, touffue, serrée, très-ramifiée.

Cette plante a été recueillie au Pérou par M. Jof. de Jussieu. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

72. ORTIE à feuilles de mélastome. *Urtica melastomoides*.

Urtica foliis oppositis, ovato-lanceolatis, glabris, serratis, trinerviis, basi subinaequalibus; floribus laxè racemoso-paniculatis, caule herbaceo. (N.)

Cette espèce est très-rapprochée de l'*Urtica multiflora*, à laquelle elle ressemble, surtout par ses feuilles; mais leurs dentelures sont moins fines, plus lâches; les nervures moins saillantes; la base des feuilles souvent inégale à leurs côtés. Les tiges sont grêles, herbacées; les pédoncules terminaux, opposés, très-longs, divisés vers leur sommet en grappes lâches, souvent ramifiées, formant par leur ensemble une ample panicule étalée.

Cette plante croît à l'île de Java, où elle a été recueillie par Commerfon. (*V. f. in herb. Juss.*)

73. ORTIE de Magellan. *Urtica magellanica*. Juss.

Urtica foliis oppositis, ovato-lanceolatis, grosse serratis; floribus glomeratis, petiolo brevioribus; caule hirsuto. (N.)

Très-rapprochée, par son port, de l'*Urtica dioica*, elle en diffère principalement par la disposition de ses fleurs. Ses tiges sont droites, herbacées, cylindriques, médiocrement pileuses; les feuilles opposées, pétiolées, ovales, lancéolées, élargies & non en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, rarement parsemées de quelques poils blanchâtres, acuminées à leur sommet, à larges dentelures; les fleurs agglomérées, formant, dans l'aisselle de feuilles, de petites panicules plus courtes que les pétioles.