

ternatis glabris : foliol. angusto-euneiformibus apice trilobis integrisque flor. dioicis. Dumont. Cours. Bot. Cultiv. 3. p. 568. Hab. in Africa. Spinae axillares demum foliosae.

35. *Cratægiiforme*. Rh. *Oxyacantha*, caul. fruticoso inermi, fol. ternatis conis, foliol. orato - cuneatis : medio longiore. Cav. in Annal. de scienc. nat. p. 36. †

36. *laevigatum*, fol. ternatis : foliolis sessilibus lanceolatis laevibus. Hab. al Cap. b. speci. Panic. longa, tenuissima sempervir. h

37. *lucidum*, fol. ternatis, foliolis obovatis retusis glabris. Thunb. prod. p. 54. Cav. ic. p. 27. t. 132. Pluck. alm. 319. t. 218. f. 9. Burm. afr. 25a. t. 91. f. 2. Hab. ad Cap. b. speci, inque Mexico. Semperfiriens. h

38. *elancum*, fol. ternatis : foliolis obcordatis, nonnullis glanco - pulverulentis. Elegans species. Foliol. parvula, nitida emarginata : a inferiora minora. Semperf.

39. *undulata*, fol. ternatis : foliol. glabris obovalis undulatis, petiol. conspicuatis dilatatis. Ex Hort. Celsii. Foliol. majus passim subrhomboidale apice in nonnullis subincisis. Diversum a R. suaveolente. Semperf.

40. *aequale*, fol. ternatis : fol. omnib. magnitudine aequalibus subseabris, obovato-lanceolatis integris, caul. petiolisque puberulis. Hinc inde colitur. Fol. majuscula cum parvo mucrone.

41. *lanceum*, fol. ternatis : fol. lanceolatis glabris integerrimi, flor. paniculatis. Foliola a inferiora paullo minora, forma aequalis : angulo recto distanta; margine subrevoluta mucronata. Panic. fol. longior. An Rh. *lanceum*. Linn. suppl. p. 184. aut Thunb. prod. p. 52 ?

*Obs.* Tres posteriores species (forte quoque ex Cap. b. speci) accurius examen adhuc merentur, an forte cum una alterave jam cognitis eadem sint nec ne.

#### \* \* \* Folii simplicibus.

42. *Cotinus*, fol. simplicibus obovatis. Jacq. austr. t. 210. R. racemis plumosis, fol. ovatis. Bell. helv. n°. 827. Hab. in Lombardia, Carniola, Helvetia, Sibiria, Austria. h

43. *atrum*, fol. simplicibus ovato - oblongis, floribus polygamis. Forst. prod. 142. Hab. in N. Caledonia. h

727. VIBURNUM. Cal. 5-partitus,

superus. Cor. 5-fida. Bacea aut Drupa 1-perma.

#### \* Folii integerrimis.

1. *Tinus*, fol. integerrimis ovatis opacis: ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. L. Willd. Sp. 2. p. 1486. Curt. Magaz. t. 38. Hab. in Lusitania, Hispania, Italia et Barberie. h

2. *lucidum*, fol. coriaceis ex ovato sublongo - cœolatis nitentibus integerrimis. V. Tinus. var. β. Ait. Kew. p. 370. Hab. in Hispania. Caul. hamilis. Cor. majuscula lactea ex tuis rubescens. Caul. subquadriangularis.

3. *rugosum*, foliis lato - ovatis rugosis subtus hirsutis, involuer. universali 7-phylo. V. Tinus. Var. hirta. Ait.? Hab. in ins. Canariae. Flor. sub finem hyemis. Caul. rotundatus, rami subangulatis pilosis. Flor. subodorati congesti. Huc V. Tinus. Var. laufolia et V. strictum Hortul.

4. *Tinoides*, fol. ellipticis glabris integerrimis, rami cymisque teretibus hirsutis. Linn. suppl. 184. Hab. in America meridionali. h

5. *villosum*, fol. integerrimis ovatis, subtus incano - villosis. Swartz. fl. ind. orcid. 1. p. 564. Hab. in montibus Jamaicæ. h

#### \* Fol. serratis aut crenatis.

6? *scandens*, fruticosum scandens, fol. oblongis serratis, cymis terminalibus, radiis terminatis flore maximo. Linn. suppl. 184. V. virens. Thunb. jap. 133. Hab. in Japonia. Stamina 10. styl. et fructus ignotus. Thunb. h †

7. *nudum*, fol. ovalib. subrugosis margine revolutis obsolete crenulatis. Ait. Kew. 1. p. 370. V. fol. integerrimis lanceolato-ovatis. Lin. Sp. pl. 38. Mill. ic. 183. t. 274. Hab. in Virginia. Gymne in hac nudæ, s. mon involucratae. h

8. *prunifolium*, fol. ovatis ovalibusque glabris arguto serratis, petiolis marginatis. Ait. Kew. 1. p. 30. Lonicera mongolica. Pall. ross. 2. p. 30. Lonicera mongolica. Pall. ross. 1. p. 59. t. 38. Gmel. sils. 3. t. 25. Hab. in Dauria. h

9. *davuricum*, fol. ovatis serratis pungitato-pilosus, cymis dichotomis paucifloris. Pall. ross. 2. p. 30. Lonicera mongolica. Pall. ross. 1. p. 59. t. 38. Gmel. sils. 3. t. 25. Hab. in Davuria. h

10. *dentalatum*, fol. ovatis dentato-serratis plicatis, fruct. subglobosis. Lucidum, fol.