

Blumen dagegen sehr groß, 6-7 L.
lang, gelb und röthlich. Lk.

- 2. *ASTRAGALUS hamosus. P.
- 2. *BISERRULA Pelecinus. P.
- 2. *LATHYRUS aphaca. E. P.
- 2. *VICIA sativa. E. P.

510 2. ——— *aphylla* Sm.

V. aphylla. Die Blättchen schei-
nen nicht abgefallen, weil nirgends
die Stellen zu sehen sind, wo sie ge-
essen hätten. Der *Stylus* ist nicht,
wie an *vicia*, auch nicht wie an *La-*
thyrus, sondern wie an *Orobus* gleich
breit und rauh. Wegen des Mangels
an Blättchen würde ich die Pflanze
zu *Lathyrus* bringen. *L. aphyllus*
cirrhos trifidus, foliolis nullis, sti-
pulis minutis oblongis acutis, flori-
bis racemosis. Lk.

Doch redet Smith in einer Note
von langen Linear-Blättern. Die
Pflanze wird sehr hoch.

- 2. *VICIA atropurpurea. P.
- 2. *ORITHOPUS ebracteatus Dec. P.
Durch Cour.
- 2. *SCORPIURUS sulcata. E. P.

Broussonet führt noch an von
Teneiffa:
TRIFOLIUM repens.
MEDICAGO marina.
——— *litoralis*. β) *brevisetata*.
LATHYRUS setifolius L.
——— *ochrus* Dec.

TEREBINTHINACEAE.

- 2. RHUS coriaria. P. E.
- 1. CNEORUM pulverulentum.
- 2. PISTACIA *Lentiscus*. Lentisco.
P. E.
- 2. ——— *Terebinthus*. Alma-
cigo. P. E.

RHAMNEAE.

- 3. ILEX *Perado*. Acebiño. M.
I. Perado ist *I. canariensis* von
Poirret, und kann in der That als
verschieden angesehen werden. Ch.

- 1. RHAMNUS *crenulatus*.
- 520 3. ——— *glandulosus*. Sangui-
ño. M.

Malmaison t. 134.

R. gland. Die sogenannten Gland-
eln sind Haufen von Haaren in den
Winkeln der Nerven, welche oben
gewölbt hervorstecken, wie am *Lau-*
rus foetens. Lk.

- 5. RHAMNUS *coriaceus*.
Nees *Hor. Ber.* 113. t. 23. Roem.
u. Sch. 5, 281.

- 1. CELASTRUS *cassinoides*.
- 1. PITTOSPORUM *coriaceum* Aiton,
laurifol. W.
- 1. ——— *hirtum* Cav.
- 3. ARDISIA *excelsa*.
- 1. SCLEROXYLON *canariense*.
Willd. *Bed. Mag.*

EUPHORBIAEAE.

- 1. EUPHORBIA *canariensis*. Cardon.
- 1. ——— *balsamifera*. Tabay-
ba dulce.

E. balsamifera. *E. stricta* ra-
mosa, foliis lanceolatis laevibus,
glaucis; anthodiis solitariis, ter-
minatibus, capsula subglobosa, te-
nuiter velutina. Decand.

E. balsamifera Ait. *Kew. Ed. I.*
V. 2, 137. Ed. II. V. 3, 159. Willd.
Sp. 2, 889. Pers. Ench. 2, 11.

Tithymalus balsamiferus Haw.
pl. succ. 140.

Frutex dumosus 12-15 pedalis et
ultra, tortuosus. Rami teretes, gla-
bri iuniores carnosus. Folia pauca,