

Allagopappus dichotomus Cass. (Dict. Ivi, 21; W. B. l. c. II, p. 224 tab. 85.—*Conyza dichotoma* L. Suppl., p. 359. *Conyza inuloides* Ait. teste Pers. Syn. pl. II, p. 428.—*Conyza canariensis* Willd. teste W. B. l. c.—*Chrysocoma dichotoma* Jacq. Ic. Bar. tab. 171.—*Jasonia dichotoma* DC. Prodr. v, p. 477.—*Crysocoma fruticosa*... Bory de St.-Vincent. l. c. página 332, núm. 281.)

Abunda en los barrancos de los alrededores de Santa Cruz de Tenerife y en otras partes de la isla.—Mayo; en fl. y fr.—Del valle de la Orotava me la ha mandado E. Rodriguez.

Tambien se halla en Gran Canaria; pero no ha sido vista fuera de este archipiélago, siendo la única especie del género.

Vieræa lævigata W. B. Phyt. Can. II, p. 225, tab. 84 (*Bupleurum lævigatum* Brouss.—*Donia canariensis* Less.—*Jasonia lævigata* DC. teste W. B. l. c.)

(125) **Masferrer.**—RECUERDOS BOTÁNICOS DE TENERIFE. 201

Muy rara entre Buena-Vista y el valle de la punta de Teno. (W. B.)

Especie propia de esta flora.

En las islas del Cabo Verde hay la planta africana de esta misma seccion *Pegolettia senegalensis* Cass.

Pulicaria vulgaris Gärtn. (*Inula pulicaria* L.—*Aster pulicarius* All.)

Se halla en Tenerife segun Broussonet (W. B.)

Se halla muy extendida por Europa.

M. Despreaux halló en Gran Canaria (arenales de Maspalomas) la *Pulicaria crispa* C. H. Schultz (*Francoeuria crispa* Cass.—*Inula crispa* Del.) que crece además en las islas del Cabo Verde, en el Senegal, en Abisinia, en Egipto, etc.